

Клетки SK-N-DZ | 305628

Обща информация

Description

Клетъчната линия SK-N-DZ е модел на човешка невробластома, създаден от метастатична костна мозък на дете с невробластома. Тя е част от серията SK-N на клетъчни линии на невробластома и проявява характеристики на туморни клетки, произхождащи от невралния гребен. Тези клетки са адхезивни в култура и демонстрират малка фракция от клетки от страничната популация (SP), което е показателно за субпопулация, подобна на ракови стволови клетки, с висока способност за ефлукс на лекарства.

Клетките SK-N-DZ са широко използвани в научните изследвания за разкриване на ролята на генетичните и епигенетичните промени при невробластома. Доказано е, че клетъчната линия притежава амплификация на гена MYCN и мутации в гена ALK, като и двете са свързани с агресивния фенотип и лошата прогноза при невробластомите с висок риск. Освен това SK-N-DZ се използва за оценка на терапевтичния отговор към средства като ретиноиди и производни на витамин Е. Проучванията показват, че SK-N-DZ е изключително чувствителна към 13-цис-ретиноевата киселина, като проявява значителна клетъчна лиза при ниски концентрации, за разлика от други клетъчни линии на невробластома.

SK-N-DZ се използва в експерименти, изследващи диференциацията и стволовите свойства на невробластомите. Способността на клетъчната линия да образува невритни израстъци при определени условия на лечение подчертава нейния потенциал за изследване на туморната диференциация и клетъчната пластичност. Тези характеристики, съчетани с добре охарактеризирания ѝ генетичен фон, правят SK-N-DZ ценен модел за усъвършенстване на терапевтичните стратегии и за разбиране на молекулярните основи на невробластома.

Organism

Човек

Tissue

Мозък

Disease

Невробластом

Metastatic site

Костен мозък

Applications

Изследвания на тумори. Изследвания на резистентността към MRD-1. Изключителна чувствителност към цис-ретиноевата киселина; 3D клетъчна култура, имунология, невронаука

Synonyms

SKNDZ

Характеристики

Age

2 години

Gender

Жена

Ethnicity

Кавказци и коренни жители на Северна Америка

Клетки SK-N-DZ | 305628

Morphology Епителиален**Cell type** Неврони**Growth properties** Придържачи се

Регулаторни данни

Citation SK-N-DZ (каталожен номер на Cytion 305628)**Biosafety level** 1**NCBI_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL_1701

Биомолекулярни данни

Mutational profile Мутация: TP53, проста, p.Arg110Leu (c.329G>T), хомозиготна

Работа с

Culture Medium DMEM, w: 4,5 g/L глюкоза, w: 4 mM L-глутамин, w: 3,7 g/L NaHCO₃, w: 1,0 mM натриев пируват (номер на изделието на Cytion 820300a)**Supplements** Допълнете средата с 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Seeding density** $0,3 \times 10^6$ клетки/мл**Fluid renewal** 2 до 3 пъти седмично**Freeze medium** Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Клетки SK-N-DZ | 305628

Thawing and Culturing Cells

1. Уверете се, че флаконът остава дълбоко замразен при доставката, тъй като клетките се транспортират със сух лед, за да се поддържат оптимални температури по време на транспортирането.
2. При получаване съхранявайте незабавно криовиолата при температури под -150°C , за да осигурите запазване на клетъчната цялост, или преминете към стъпка 3, ако е необходимо незабавно култивиране.
3. За незабавно култивиране бързо размразете флакона, като го потопите във водна баня с чиста вода и антимикробен агент с температура 37°C , като разбърквате внимателно в продължение на 40-60 секунди, докато остане малка ледена бучка.
4. Извършвайте всички следващи стъпки при стерилни условия в аспиратор, като преди отваряне дезинфекцирате криовиолата със 70% етанол.
5. Внимателно отворете дезинфекцирания флакон и прехвърлете клетъчната суспензия в 15 ml центрофужна епруветка, съдържаща 8 ml хранителна среда със стайна температура, като разбърквате внимателно.
6. Центрофугирайте сместа при $300 \times g$ в продължение на 3 минути, за да отделите клетките, и внимателно изхвърлете супернатантата, съдържаща остатъчна замразяваща среда.
7. Внимателно ресуспендирайте клетъчната пелета в 10 ml прясна хранителна среда. За адхезивни клетки разделете суспензията между две колби T25; за суспензионни култури прехвърлете цялата среда в една колба T25, за да стимулирате ефективното взаимодействие и растеж на клетките.
8. Придържайте се към установените протоколи за субкултивиране за непрекъснат растеж и поддържане на клетъчната линия, като гарантирате надеждни експериментални резултати.

Incubation Atmosphere

37°C , 5% CO_2 , овлажнена атмосфера.

Shipping Conditions

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78°C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

Клетки SK-N-DZ | 305628

Storage Conditions

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Контрол на качеството и молекулярен анализ

Sterility

Замърсяването с микопlasма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микопlasма.

За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.