

Клетки HROC395Met1 | 300854

Обща информация

Description

Панелът от клетъчни линии HROC (рак на дебелото черво в Хансешат Роцок) включва модели на колоректален рак, получени от пациенти, разработени от първична туморна тъкан и/или съответни метастатични лезии. Тези клетъчни линии често са придружени от съответните ксенографти, получени от пациенти (PDX), и органоиди, което позволява интегративно моделиране на колоректалния рак (CRC) както *in vitro*, така и в *in vivo* системи. Моделите на HROC запазват критичното клинично и молекулярно разнообразие, което се среща при колоректалния рак, включително вариации в микросателитната нестабилност (MSI срещу MSS) и ключови генетични фактори, като мутации в APC, KRAS, BRAF, PIK3CA и TP53. Култивирани като адхезивни епителни монослоеве и обикновено използвани при нисък брой пасаж, HROC линиите поддържат фенотипна и геномна вярност с туморите на пациентите, което подпомага транслационната значимост в изследванията на лекарства и биомаркери.

Номенклатурната система за клетъчни линии HROC предоставя подробни метаданни за произхода и историята на експеримента. Например "Tu" идентифицира клетъчни линии, получени от първични тумори, "Met" - от метастатични лезии, а "T#" и "M#" обозначават съответно броя на трансферите на PDX и конкретния миши гостоприемник. Това систематично именуване позволява лесно проследяване на съвпадащи набори, като например двойки първични клетки-метастази или производни *in vitro-in vivo*. Тези съвместени модели подпомагат изследванията на клоновата еволюция, метастазите, резистентността към терапия и фармакокинетичното поведение - включително експресията на транспортерите и целостта на бариерите, свързани с абсорбцията на лекарствата. Клетъчните линии се подлагат на рутинна автентификация (напр. STR профилиране) и редовно се тестват за замърсяване с микопlasма. Данните за характеризиране на многобройни модели на HROC са публично достъпни в Cellosaurus и в рецензирани публикации.

Клетъчните линии HROC са особено ценни за подтипно стратифициран скрининг на лекарства, откриване на биомаркери при MSI-H и MSS тумори и механистични проучвания, включващи първично спрямо метастатично заболяване. Когато се комбинират с PDX и/или органоиди, те осигуряват стабилна платформа за предклинична оценка, включително тестване на лекарствената чувствителност и моделиране на взаимодействията между тумор и строма или имунната система. Благодарение на цялостната си анотация и клинична значимост моделите HROC са подходящи както за фундаментални, така и за транслационни изследвания на колоректалния рак.

Organism Човек

Tissue Метастатичен

Disease Колоректален аденокарцином

Metastatic site Черен дроб

Характеристики

Age 63 години

Клетки HROC395Met1 | 300854

Gender Мъжки

Growth properties Придържачи се

Регулаторни данни

Citation HROC395Met1 (каталожен номер 300854 на Cytion)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

Биомолекулярни данни

Работа с

Culture Medium DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L глюкоза, w: 2,5 mM L-глутамин, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM натриев пируват, w: 1,2 g/L NaHCO₃ (номер на изделието на Cytion 820400a)

Supplements Допълнете средата с 10% FBS

Dissociation Reagent TrypLE Express 15 мин 37°C

Freeze medium Като среда за криоконсервация използваме пълна хранителна среда + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване.

Клетки HROC395Met1 | 300854**Thawing and
Culturing Cells**

1. Уверете се, че флаконът остава дълбоко замразен при доставката, тъй като клетките се транспортират със сух лед, за да се поддържат оптимални температури по време на транспортирането.
2. При получаване или съхранявайте незабавно криовиолата при температури под $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$, за да осигурите запазване на клетъчната цялост, или преминете към стъпка 3, ако е необходимо незабавно култивиране.
3. За незабавно култивиране бързо размразете флакона, като го потопите във водна баня с чиста вода и антимикробен агент с температура $37\text{ }^{\circ}\text{C}$, като разбърквате внимателно в продължение на 40-60 секунди, докато остане малка ледена бучка.
4. Извършвайте всички следващи стъпки при стерилни условия в аспиратор, като преди отваряне дезинфекцирате криовиолата със 70% етанол.
5. Внимателно отворете дезинфекцирания флакон и прехвърлете клетъчната суспензия в 15 ml центрофужна епруветка, съдържаща 8 ml хранителна среда със стайна температура, като разбърквате внимателно.
6. Центрофугирайте сместа при 200 x g в продължение на 5 минути, внимателно изхвърлете супернатантата, съдържаща средата за замразяване.
7. Следвайте процедурата, описана в раздел "Възстановяване след размразяване"

**Incubation
Atmosphere**

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 , овлажнена атмосфера.

Flask Coating

Няма

**Freezing
Procedure**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

**Shipping
Conditions**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

Клетки HROC395Met1 | 300854

Storage Conditions

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Контрол на качеството / Генетичен профил / HLA