Product sheet

Клетки B-LCL-HROG17 | 302112

Обща информация

Description	B-LCL-HROG17 е трансформирана с човешкия вирус на Епщайн-Бар (EBV) В-лимфобластоидна клетъчна линия (B-LCL), получена от периферната кръв на 70-годишен мъж от кавказката раса, болен от рак на стомаха, в рамките на серията на биобанката HROG. EBV трансформацията in vitro на първични В-лимфоцити от периферната кръв доведе до получаването на стабилно безсмъртна клетъчна линия, растяща в суспензия. Клетките HROG17 притежават лимфобластоподобна морфология и конститутивно експресират латентни протеини на EBV, както и високи нива на HLA клас I и II, костимулаторните молекули CD80 и CD86, адхезивните молекули CD54 и CD58 и повърхностните антигени на В-клетките CD19, CD20 и CD23, което подкрепя мощната функция на антиген-представящите клетки. B-LCL-HROG17 се използва в тестове с Т-клетки и NK-клетки, HLA-типизиране, смесени лимфоцитни реакции, изследвания на антигенното представяне и протоколи за цитотоксични Т-клетки (CTL). Като част от биобанката HROG, съобразена с пациентите, тя предоставя дефинирана имунологична референция за имунологични изследвания на рака на стомаха. Профилът на 70-годишния мъж-донор е подходящ за проучвания на свързаната с възрастта имунна функция в контекста на рака на стомаха, включително анализи на реактивността на Т-клетките и ефективността на антиген-представящите клетки при по-възрастни мъже.
Organism	Човек
Tissue	Периферна кръв
Disease	EBV-трансформирана В-лимфобластоидна клетъчна линия (B-LCL); донор, при когото е диагностициран рак на стомаха
Applications	Изследвания в областта на имунологията; тестове за Т-клетки и NK-клетки; HLA-типизиране; изследвания на представянето на антигени; смесени лимфоцитни реакции; мишени за тестове на цитотоксични Т-клетки (CTL); имунология на рака на стомаха

Характеристики

Age	70 години
Gender	Мъжки
Ethnicity	Кавказки
Morphology	Лимфобластно-подобни
Cell type	В лимфобласт

Клетки B-LCL-HROG17 | 302112

Growth properties	Окачване

Регулаторни данни

Citation	B-LCL-HROG17 (каталожен номер на Cytion 302112)
Biosafety level	2
NCBI_TaxID	9606
GMO Status	GMO-S2: Тази B-LCL съдържа стабилно поддържан епизом на EBV, кодиращ гени от латентната фаза на вируса (EBNA-1/-2/-3, LMP-1/-2). EBV е класифициран като патоген от рискова група 2. Работата с него изисква изолация от ниво BSL-2. Тази класификация важи за територията на Германия; нормативните изисквания в други юрисдикции могат да се различават.

Биомолекулярни данни

Viruses	Трансформатор: EBV

Работа с

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)
Supplements	Добавете към средата 15–20 % FBS
Doubling time	24 до 48 часа
Subculturing	На всеки 2–3 дни разреждайте културата до 2–5 × 10^5 клетки/мл с прясна, предварително затоплена пълна среда. Пребройте жизнеспособните клетки преди пресаждане, за да поддържате оптимална плътност. Не позволявайте културите да надвишават 2 × 10^6 клетки/мл. При необходимост може да се използва центрофугиране (300 × g, 5 мин.) за подмяна на средата. Не се изисква ензимна дисоциация.
Split ratio	от 1 до 4
Seeding density	от 2 до 5 × 10^5 клетки/мл
Fluid renewal	На всеки 2 до 3 дни

Клетки B-LCL-HROG17 | 302112

Freeze medium	Като среда за криоконсервация използваме пълна хранителна среда + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване.

Thawing and Culturing Cells

1. Уверете се, че флаконът остава дълбоко замразен при доставката, тъй като клетките се транспортират със сух лед, за да се поддържат оптимални температури по време на транспортирането.
2. При получаване или съхранявайте незабавно криовиолата при температури под -150 °C, за да осигурите запазване на клетъчната цялост, или преминете към стъпка 3, ако е необходимо незабавно култивиране.
3. За незабавно култивиране бързо размразете флакона, като го потопите във водна баня с чиста вода и антимикробен агент с температура 37 °C, като разбърквате внимателно в продължение на 40-60 секунди, докато остане малка ледена бучка.
4. Извършвайте всички следващи стъпки при стерилни условия в аспиратор, като преди отваряне дезинфекцирате криовиолата със 70% етанол.
5. Внимателно отворете дезинфекцирания флакон и прехвърлете клетъчната суспензия в 15 ml центрофужна епруветка, съдържаща 8 ml хранителна среда със стайна температура, като разбъркате внимателно.
6. Центрофугирайте сместа при 200 x g в продължение на 5 минути, внимателно изхвърлете супернатантата, съдържаща средата за замразяване.
7. Следвайте процедурата, описана в раздел "Възстановяване след размразяване"

Incubation Atmosphere	37°C, 5%$_{CO2}$, овлажнена атмосфера.
Shipping Conditions	Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.
Storage Conditions	За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Клетки B-LCL-HROG17 | 302112

Контрол на качеството и молекулярен анализ