

Клетки NCI-H3122 | 300484

Обща информация

Description

Клетъчната линия NCI-H3122 е получена от недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКБД) и се характеризира с наличието на фюзън гена EML4-ALK, който е резултат от хромозомна транслокация между ехинодермалния микротубул-асоцииран протеин, подобен на 4 (EML4), и анапластичната лимфом киназа (ALK). Този синтез задвижва онкогенните сигнали и прави клетките NCI-H3122 силно зависими от сигналите на ALK за оцеляване, известни като "ALK-зависими" NCI-H3122 се е превърнал в ключов модел за изследване на целеви терапии, особено за инхибитори на ALK като кризотиниб.

Проучванията показват, че клетките NCI-H3122 са чувствителни към кризотиниб, който инхибира фосфорилирането на ALK и неговите низходящи цели като пътищата AKT и ERK. Често обаче се развива резистентност към кризотиниб, обикновено поради алтернативни сигнални пътища, като например активиране на рецептора за епидермален растежен фактор (EGFR). Този механизъм на резистентност е потвърден при резистентни варианти на NCI-H3122, при които е наблюдавано повишено фосфорилиране на EGFR, и е доказано, че двойното инхибиране на ALK и EGFR с помощта на кризотиниб и инхибитори на EGFR, като например afatinib или erlotinib, преодолява резистентността.

NCI-H3122 често се използва за проучване на комбинирани терапии, насочени към предотвратяване или обръщане на лекарствената резистентност. Например, насочването към двата пътя ALK и EGFR е успешна стратегия в предклинични модели и това двойно инхибиране е предложено като потенциален терапевтичен подход за ALK-позитивни, резистентни към кризотиниб пациенти с NSCLC.

Organism

Човек

Tissue

Бял дроб

Disease

Аденокарцином

Synonyms

NCI-H3122, H-3122, NCIH3122

Характеристики

Gender

Мъжки

Ethnicity

Кавказки

Growth properties

Придържачи се

Регулаторни данни

Citation

NCI-H3122 (каталожен номер 300484 на Cytion)

Клетки NCI-H3122 | 300484

Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_5160

Биомолекулярни данни

Работа с

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO ₃ (номер на статията в Cytion 820700a)
-----------------------	--

Supplements	Допълнете средата с 10% FBS
--------------------	-----------------------------

Dissociation Reagent	Accutase
-----------------------------	----------

Subculturing	Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирайте, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.
---------------------	--

Freeze medium	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.
----------------------	---

Клетки NCI-H3122 | 300484

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Уверете се, че флаконът остава дълбоко замразен при доставката, тъй като клетките се транспортират със сух лед, за да се поддържат оптимални температури по време на транспортирането.
2. При получаване или съхранявайте незабавно криовиолата при температури под $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$, за да осигурите запазване на клетъчната цялост, или преминете към стъпка 3, ако е необходимо незабавно култивиране.
3. За незабавно култивиране бързо размразете флакона, като го потопите във водна баня с чиста вода и антимикробен агент с температура $37\text{ }^{\circ}\text{C}$, като разбърквате внимателно в продължение на 40-60 секунди, докато остане малка ледена бучка.
4. Извършвайте всички следващи стъпки при стерилни условия в аспиратор, като преди отваряне дезинфекцирате криовиолата със 70% етанол.
5. Внимателно отворете дезинфекцирания флакон и прехвърлете клетъчната суспензия в 15 ml центрофужна епруветка, съдържаща 8 ml хранителна среда със стайна температура, като разбърквате внимателно.
6. Центрофугирайте сместа при 300 x g в продължение на 3 минути, за да отделите клетките, и внимателно изхвърлете супернатантата, съдържаща остатъчна замразяваща среда.
7. Внимателно ресуспендирайте клетъчната пелета в 10 ml прясна хранителна среда. За адхезивни клетки разделете суспензията между две колби T25; за суспензионни култури прехвърлете цялата среда в една колба T25, за да стимулирате ефективното взаимодействие и растеж на клетките.
8. Придържайте се към установените протоколи за субкултивиране за непрекъснат растеж и поддържане на клетъчната линия, като гарантирате надеждни експериментални резултати.

**Incubation
Atmosphere**

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 , овлажнена атмосфера.

Flask Coating

Няма

**Freezing
Procedure**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

Клетки NCI-H3122 | 300484**Shipping
Conditions**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

**Storage
Conditions**

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Контрол на качеството / Генетичен профил / HLA**Sterility**

Замърсяването с микопlasма се изключва както чрез PCR-базиран анализ, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микопlasма.

За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

**Профил на
STR**

Amelogenin: x,x
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
TH01: 7,9,3
TPOX: 10,1
vWA: 16,16
D3S1358: 16,16
D21S11: 28, 29
D18S51: 13,16
Penta E: 12,12
Penta D: 10,13
D8S1179: 13:15
FGA: 18,21

HLA аели

A*: '03:01:01
B*: '35:01:01
C*: '04:01:01
DRB1*: '13:01:01
DQA1*: '01:03:01
DQB1*: '06:03:01
DPB1*: '14:01:01
E: '01:03:02