

## Клетки SK-MEL-29.1 | 300429

## Обща информация

## Description

SK-MEL-29.1 е меланомна клетъчна линия, която е подробно проучена за взаимодействието ѝ с имунната система, особено в контекста на разпознаването на цитотоксични Т-лимфоцити (CTL). Този подклон на меланомната линия SK-MEL-29 е използван в имунологични изследвания за определяне на специфични антигени, разпознавани от автоложни CTL. Тези CTL селективно се насочват към меланомни клетки, експресиращи определени антигени, като същевременно щадят нераковите клетки. При експерименти за имуноселекция е установено, че SK-MEL-29.1 експресиращи стабилни антигени, които са важни за специфичния лизис на меланомни клетки от CTL, което дава представа за имуногенността на туморите и избягването на имунната защита.

Едно от ключовите проучвания, включващи SK-MEL-29.1, показва неговата полезност в изследванията на имунотерапията на рака. Доказано е, че CTL клонинги, получени от пациенти AV, ефективно се насочват към клетките SK-MEL-29.1, които експресират множество антигени едновременно. Това превръща SK-MEL-29.1 във важен модел за разбиране на това как имунните отговори могат да бъдат адаптирани към специфични антигени при меланома. Способността на тези CTL клонинги да идентифицират и лизират меланомни клетки предоставя ценна информация за разработването на имунотерапевтични стратегии, включително възможността за генериране на персонализирани противоракови ваксини.

Освен това клетките SK-MEL-29.1 са тествани и при разработването на ваксини срещу рак на вирусна основа. Инфектирането с вируса на нюкасълската болест (NDV), вирус с онколитични и имуностимулиращи свойства, показва, че SK-MEL-29.1 може да бъде ефективно инфектиран от NDV дори след гама-облъчване, което го прави подходящ кандидат за разработване на живи ракови ваксини. Тази инфекция повишава имуногенността на туморните клетки, което води до по-силен противотуморен имунен отговор, което допълнително подкрепя използването на SK-MEL-29.1 в изследванията на ваксини.

**Organism** Човек

**Tissue** Кожа

**Disease** Меланома

## Характеристики

**Age** 19 години

**Gender** Мъжки

**Morphology** Епителиален

**Growth properties** Придържащи се

## Клетки SK-MEL-29.1 | 300429

## Регулаторни данни

<b>Citation</b>	SK-MEL-29.1 (каталожен номер 300429 на Cytion)
<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	9606
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_IY54

## Биомолекулярни данни

## Работа с

<b>Culture Medium</b>	DMEM, w: 4,5 g/L глюкоза, w: 4 mM L-глутамин, w: 3,7 g/L NaHCO <sub>3</sub> , w: 1,0 mM натриев пируват (номер на изделието на Cytion 820300a)
<b>Supplements</b>	Допълнете средата с 10% FBS
<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
<b>Subculturing</b>	Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирате, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.
<b>Freeze medium</b>	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

## Клетки SK-MEL-29.1 | 300429

**Thawing and  
Culturing Cells**

1. Уверете се, че флаконът остава дълбоко замразен при доставката, тъй като клетките се транспортират със сух лед, за да се поддържат оптимални температури по време на транспортирането.
2. При получаване или съхранявайте незабавно криовиолата при температури под  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ , за да осигурите запазване на клетъчната цялост, или преминете към стъпка 3, ако е необходимо незабавно култивиране.
3. За незабавно култивиране бързо размразете флакона, като го потопите във водна баня с чиста вода и антиминобен агент с температура  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , като разбърквате внимателно в продължение на 40-60 секунди, докато остане малка ледена бучка.
4. Извършвайте всички следващи стъпки при стерилни условия в аспиратор, като преди отваряне дезинфекцирате криовиолата със 70% етанол.
5. Внимателно отворете дезинфекцирания флакон и прехвърлете клетъчната суспензия в 15 ml центрофужна епруветка, съдържаща 8 ml хранителна среда със стайна температура, като разбърквате внимателно.
6. Центрофугирайте сместа при 300 x g в продължение на 3 минути, за да отделите клетките, и внимателно изхвърлете супернатантата, съдържаща остатъчна замразяваща среда.
7. Внимателно ресуспендирайте клетъчната пелета в 10 ml прясна хранителна среда. За адхезивни клетки разделете суспензията между две колби T25; за суспензионни култури прехвърлете цялата среда в една колба T25, за да стимулирате ефективното взаимодействие и растеж на клетките.
8. Придържайте се към установените протоколи за субкултивиране за непрекъснат растеж и поддържане на клетъчната линия, като гарантирате надеждни експериментални резултати.

**Incubation  
Atmosphere**

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , овлажнена атмосфера.

**Flask Coating**

Няма

**Freezing  
Procedure**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

## Клетки SK-MEL-29.1 | 300429

### Shipping Conditions

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително  $-78^{\circ}\text{C}$  по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

### Storage Conditions

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около  $-150$  до  $-196^{\circ}\text{C}$ . Съхранението при  $-80^{\circ}\text{C}$  е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

## Контрол на качеството / Генетичен профил / HLA

### Sterility

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.

За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.