

## клетки 6T-CEM | 305132

## Обща информация

## Description

Клетъчната линия 6T-CEM е мутантна производна на човешката Т-клетъчна линия за остра лимфобластна левкемия (ALL) CCRF-CEM. Тя е разработена чрез излагане на изходните клетки CEM на 6-тиогуанин, което води до селектиране на подлиния, проявяваща резистентност към това съединение. Тази резистентност е резултат от инактивирането на гена HPRT, който е от решаващо значение за пътя на спасяване на пурините. Клетките 6T-CEM са особено ценни при изучаването на механизмите на лекарствена резистентност, особено по отношение на пуринови аналози като 6-тиогуанин. Освен това тези клетки се характеризират с отделянето на уникален индуциращ фактор за супресия на Т-клетките (SIF), който не само не е митогенен и не е цитотоксичен, но също така е способен да потиска пролиферацията на Т-клетките, като същевременно запазва пролиферацията на В-клетките при определени разреждания.

клетките 6T-CEM и техните подклонове, като 6T-CEM-20, показват значително увеличение на производството на този супресорен индуциращ фактор, който има потенциални приложения в имунологичните изследвания, особено в изучаването на регулацията на Т-клетките и имунната супресия. Установено е, че секретираният от тези клетки SIF потиска до 90 % от индуцираната от митоген пролиферация на Т-клетките при изключително високи разреждания (до  $10^{-9}$ ), което прави тези клетки мощен модел за изследване на терапевтични стратегии, включващи модулиране на имунния отговор. Използването на тези клетки в различни експериментални постановки е дало представа за молекулярните основи на имунното потискане с потенциални последици за разработването на лечения за автоимунни заболявания и в контекста на трансплантацията на органи за предотвратяване на отхвърлянето на присадката.

## Organism

Човек

## Tissue

Периферна кръв

## Disease

Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия

## Synonyms

6-T CEM

## Характеристики

## Age

4 години

## Gender

Жена

## Ethnicity

Азиатски

## Morphology

Лимфобласт

## Growth properties

Окачване

## клетки 6T-CEM | 305132

## Регулаторни данни

<b>Citation</b>	6T-CEM (каталожен номер 305132 на Cytion)
<b>Biosafety level</b>	2
<b>NCBI_TaxID</b>	9606
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_6869

## Биомолекулярни данни

## Работа с

<b>Culture Medium</b>	Alpha MEM, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w/o: Рибонуклеозиди, w/o: Дезоксирибонуклеозиди, w: 1,0 mM Натриев пируват, w: 2,2 g/L NaHCO <sub>3</sub>
<b>Supplements</b>	Допълнете средата с 10% FBS
<b>Subculturing</b>	Нежно хомогенизирайте клетъчната суспензия в колбата, като я пипетирате нагоре и надолу, след което вземете представителна проба, за да определите клетъчната плътност на мл. Разрежете суспензията, за да постигнете клетъчна концентрация от $1 \times 10^5$ клетки/мл с прясна културална среда, и разпределете коригираната суспензия в нови колби за по-нататъшно култивиране.
<b>Fluid renewal</b>	2 до 3 пъти седмично
<b>Freeze medium</b>	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

## клетки 6T-CEM | 305132

**Thawing and  
Culturing Cells**

1. Уверете се, че флаконът остава дълбоко замразен при доставката, тъй като клетките се транспортират със сух лед, за да се поддържат оптимални температури по време на транспортирането.
2. При получаване или съхранявайте незабавно криовиолата при температури под  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ , за да осигурите запазване на клетъчната цялост, или преминете към стъпка 3, ако е необходимо незабавно култивиране.
3. За незабавно култивиране бързо размразете флакона, като го потопите във водна баня с чиста вода и антимикуробен агент с температура  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , като разбърквате внимателно в продължение на 40-60 секунди, докато остане малка ледена бучка.
4. Извършвайте всички следващи стъпки при стерилни условия в аспиратор, като преди отваряне дезинфекцирате криовиолата със 70% етанол.
5. Внимателно отворете дезинфекцирания флакон и прехвърлете клетъчната суспензия в 15 ml центрофужна епруветка, съдържаща 8 ml хранителна среда със стайна температура, като разбърквате внимателно.
6. Центрофугирайте сместа при 300 x g в продължение на 3 минути, за да отделите клетките, и внимателно изхвърлете супернатантата, съдържаща остатъчна замразяваща среда.
7. Внимателно ресуспендирайте клетъчната пелета в 10 ml прясна хранителна среда. За адхезивни клетки разделете суспензията между две колби T25; за суспензионни култури прехвърлете цялата среда в една колба T25, за да стимулирате ефективното взаимодействие и растеж на клетките.
8. Придържайте се към установените протоколи за субкултивиране за непрекъснат растеж и поддържане на клетъчната линия, като гарантирате надеждни експериментални резултати.

**Incubation  
Atmosphere**

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , овлажнена атмосфера.

**Flask Coating**

Няма

**Freezing  
Procedure**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

**клетки 6T-CEM | 305132**

**Shipping  
Conditions**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително  $-78^{\circ}\text{C}$  по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

**Storage  
Conditions**

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около  $-150$  до  $-196^{\circ}\text{C}$ . Съхранението при  $-80^{\circ}\text{C}$  е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

**Контрол на качеството / Генетичен профил / HLA**

**Sterility**

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.

За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.