

Клетки TF-1 | 300434

Обща информация

Description

Клетките TF-1 са еритробласти, изолирани от костния мозък на 35-годишен мъж от азиатски произход, диагностициран с тежка панцитопения през 1987 г. Тези клетки са основен модел за изучаване на сложните процеси на пролиферация и диференциация в миелоидните прогениторни клетки. Като клетъчна линия TF-1 се използва активно в хематологичните изследвания, за да се разберат основните механизми, които управляват регулирането на клетъчния цикъл и развитието на миелоидните линии.

В допълнение към основната си роля в хематопоезичните изследвания, клетките TF-1 служат като надеждна система за изследване на въздействието на различни цитокини върху оцеляването и растежа на клетките. Зависимостта им от специфични растежни фактори като гранулоцит-макрофажен колонистимулиращ фактор (GM-CSF) и интерлевкин-3 (IL-3) за пролиферацията ги прави отличен инструмент за изучаване на цитокин-медираните сигнални пътища. Тази характеристика прави TF-1 клетките полезни и за оценка на ефикасността на нови фармакологични средства, които имат за цел да модулират тези пътища, като по този начин допринасят значително за терапевтичния напредък в лечението на миелоидни заболявания и други свързани с тях заболявания.

Organism

Homo sapiens (човек)

Tissue

Костен мозък

Disease

Остра еритроидна левкемия

Applications

Клетъчната линия TF-1 може да се използва в различни системи поради реактивността ѝ към множество цитокини. Те представляват добра система за изследване на пролиферацията и диференциацията на миелоидните прогениторни клетки. Чувствителни към GM-CSF, IL-3, EPO.

Synonyms

TF1, MFD-1

Характеристики

Age

35Y

Gender

Мъжки

Ethnicity

Японски

Morphology

лимфобласт

Growth properties

окачване

Клетки TF-1 | 300434

Регулаторни данни

Citation	TF-1 (каталожен номер 300434 на Cytion)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0559

Биомолекулярни данни

Receptors expressed	Клетките TF-1 не експресират гликофорин А или карбонил анхидраза I.
Mutational profile	Мутация: p.Gln61Pro, хетерозиготна; Мутация: p.Ile251Thrfs*94, неуточнена

Работа с

Culture Medium	60-70% RPMI 1640 + 20% h.i. FBS + 10-20% обем кондиционирана среда от клетъчна линия 5637 (DSM ACC 35) (или 1-5 ng/ml рекомбинантен GM-CSF или IL-3)
Supplements	За дългосрочно култивиране допълнете средата с 10% FBS: IL-3
Doubling time	39 +/- 6 часа; 22 часа; ~70 часа
Subculturing	Започнете култури с клетъчна плътност 2×10^5 клетки/ml и ги поддържайте в диапазона от 1×10^5 до 1×10^6 клетки/ml. За субкултивиране прехвърлете клетъчната суспензия в нова колба за клетъчна култура, предварително напълнена с правилния обем свежа културална среда.
Seeding density	$> 2 \times 10^5$ клетки/ml
Fluid renewal	2 до 3 пъти седмично
Freeze medium	Като среда за криоконсервация използваме пълна хранителна среда + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване.

Клетки TF-1 | 300434

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Уверете се, че флаконът остава дълбоко замразен при доставката, тъй като клетките се транспортират със сух лед, за да се поддържат оптимални температури по време на транспортирането.
2. При получаване или съхранявайте незабавно криовиолата при температури под $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$, за да осигурите запазване на клетъчната цялост, или преминете към стъпка 3, ако е необходимо незабавно култивиране.
3. За незабавно култивиране бързо размразете флакона, като го потопите във водна баня с чиста вода и антимикробен агент с температура $37\text{ }^{\circ}\text{C}$, като разбърквате внимателно в продължение на 40-60 секунди, докато остане малка ледена бучка.
4. Извършвайте всички следващи стъпки при стерилни условия в аспиратор, като преди отваряне дезинфекцирате криовиолата със 70% етанол.
5. Внимателно отворете дезинфекцирания флакон и прехвърлете клетъчната суспензия в 15 ml центрофужна епруветка, съдържаща 8 ml хранителна среда със стайна температура, като разбърквате внимателно.
6. Центрофугирайте сместа при $200 \times g$ в продължение на 5 минути, внимателно изхвърлете супернатантата, съдържаща средата за замразяване.
7. Следвайте процедурата, описана в раздел "Възстановяване след размразяване"

**Incubation
Atmosphere**

37°C , 5% CO_2 , овлажнена атмосфера.

Flask Coating

Няма

**Freezing
Procedure**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

**Shipping
Conditions**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

Клетки TF-1 | 300434

Storage Conditions

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Контрол на качеството / Генетичен профил / HLA

Sterility

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.

За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

HLA алели

A*: '02:01:01, '33:03:01

B*: '44:03:01, '51:01:01

C*: '01:02:01, '14:03:01

DRB1*: '09:01:02G, '13:02:01

DQA1*: '01:02:01, '03:02:01

DQB1*: '03:03:02, '06:04:01

DPB1*: '02:01:02, '04:01:01

E: '01:01:01, '01:03:01