

Клетки LNCaP | 300265

Обща информация

Description

Клетките LNCaP, получени от метастатична лезия в лимфен възел на пациент с рак на простатата, представляват важен инструмент в изследванията на рака на простатата, особено за изучаване на ролята на андрогените и динамиката на андрогенния рецептор (AR) в прогресията на рака. Клетъчната линия LNCaP се характеризира с андроген-чувствителен растеж и предлага прозорец към механизмите, лежащи в основата на отговора на рака на простатата към хормонални манипулации.

Като модел за метастатичен рак на простатата родителските LNCaP клетки и техните подлинии, като LNCaP клонинга FGC, предоставят клинично значими прозрения за прогресията на заболяването, особено в контекста на метастазите в костите, образувайки остеобластни лезии, подобни на тези, наблюдавани при човешкия рак на простатата.

Клетъчната линия на човешкия рак на простатата LNCaP експресира мутирала форма на гена AR с по-широка специфичност на стероидното свързване и поради това е от ключово значение за разбирането на сложното взаимодействие между активността на AR и прогресията на рака на простатата. Това включва изследване на целите на AR надолу по веригата, като PSA и NKx3.1, които са от решаващо значение за функцията на епителните клетки на простатата. Клетките LNCaP се използват и за изследвания на цитотоксичността, като например тази, предизвикана от *gr1*, или на потенциалните терапевтични ефекти на съединения като амигдалин, в рамките на стратегиите за вътреклетъчно доставяне на лекарства.

В обобщение, човешката клетъчна линия за карцином на простатата LNCaP служи като крайъгълен камък в разбирането на ролята на андрогените в прогресията на рака и рака на простатата, предлагайки прозрения за хормонореактивните ракови заболявания, предизвикателствата на резистентния рак на простатата и потенциала за терапевтични интервенции. Клетъчната линия LNCaP се счита за една от класическите и най-широко използвани човешки клетъчни линии за рак на простатата, наред с клетките DU145 и PC3.

Organism Човек

Tissue Простата

Disease Карцином

Metastatic site Ляв супраклавикуларен лимфен възел

Synonyms LNCAP, LNCaP, Ln-CaP, Карцином на лимфния възел на простатата

Характеристики

Age 50 години

Gender Мъжки

Клетки LNCaP | 300265

Ethnicity Кавказки**Morphology** Подобни на епител**Growth properties** Прилепнали, кълстери

Регулаторни данни

Citation LNCaP (каталожен номер 300265 на Cytion)**Biosafety level** 1**NCBI_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL_0395

Биомолекулярни данни

Receptors expressed Андроген, естроген**Protein expression** P53 положителен**Tumorigenic** Да, при голи мишки**Products** Човешка простатна киселинна фосфатаза, простатен специфичен антиген**Karyotype** Псевдодиплоиден мъжки, седем маркерни хромозоми, модален брой = 46, диапазон = 33 до 91

Работа с

Culture Medium RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (номер на статията в Cytion 820700a)**Supplements** Допълнете средата с топлинно активиран 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase

Клетки LNCaP | 300265

Doubling time 60 часа

Subculturing Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирате, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.

Seeding density 1 до 2×10^4 клетки/cm²**Fluid renewal** На всеки 3 дни

Post-Thaw Recovery След размразяване, поставете клетките в плаки с плътност 5×10^4 клетки/cm² и оставете клетките да се възстановят от процеса на замразяване и да се прикрепят за най-малко 24 часа.

Freeze medium Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Клетки LNCaP | 300265

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Уверете се, че флаконът остава дълбоко замразен при доставката, тъй като клетките се транспортират със сух лед, за да се поддържат оптимални температури по време на транспортирането.
2. При получаване или съхранявайте незабавно криовиолата при температури под $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$, за да осигурите запазване на клетъчната цялост, или преминете към стъпка 3, ако е необходимо незабавно култивиране.
3. За незабавно култивиране бързо размразете флакона, като го потопите във водна баня с чиста вода и антиминобен агент с температура $37\text{ }^{\circ}\text{C}$, като разбърквате внимателно в продължение на 40-60 секунди, докато остане малка ледена бучка.
4. Извършвайте всички следващи стъпки при стерилни условия в аспиратор, като преди отваряне дезинфекцирате криовиолата със 70% етанол.
5. Внимателно отворете дезинфекцирания флакон и прехвърлете клетъчната суспензия в 15 ml центрофужна епруветка, съдържаща 8 ml хранителна среда със стайна температура, като разбърквате внимателно.
6. Центрофугирайте сместа при 300 x g в продължение на 3 минути, за да отделите клетките, и внимателно изхвърлете супернатантата, съдържаща остатъчна замразяваща среда.
7. Внимателно ресуспендирайте клетъчната пелета в 10 ml прясна хранителна среда. За адхезивни клетки разделете суспензията между две колби T25; за суспензионни култури прехвърлете цялата среда в една колба T25, за да стимулирате ефективното взаимодействие и растеж на клетките.
8. Придържайте се към установените протоколи за субкултивиране за непрекъснат растеж и поддържане на клетъчната линия, като гарантирате надеждни експериментални резултати.

**Incubation
Atmosphere**

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 , овлажнена атмосфера.

Flask Coating

Няма

**Freezing
Procedure**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

Клетки LNCaP | 300265**Shipping
Conditions**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед във валидирана, изолирана опаковка с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

**Storage
Conditions**

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Контрол на качеството / Генетичен профил / HLA**Sterility**

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.

За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

HLA алели

A*: '01:01:01, '02:01:01
B*: '08:01:01, '37:01:01
C*: '06:02:01, '07:01:01
DRB1*: '03:01:01, '10:01:01
DQA1*: '01:05:01, '05:01:01
DQB1*: '02:01:01, '05:01:01
DPB1*: '02:01:02G, '04:02:01G
E: '01:01:01