

## Buňky HEK293-PSMA | 305992

## Obecné informace

## Description

**Upozornění: Ceny uvedené u buněčných linií platí výhradně pro akademické a neziskové zákazníky. Pro komerční subjekty činí cena přibližně 6 250 EUR.**

**Pokud zastupujete komerční subjekt nebo si nejste jisti, do které kategorie spadáte, prosím [nás kontaktujte](#).**

Buňky HEK293-PSMA jsou buňky lidské embryonální ledviny 293 (HEK293) upravené tak, aby stabilně exprimovaly lidský prostatický specifický membránový antigen (PSMA), známý také jako glutamátcarboxypeptidáza II (FOLH1/GCPII). PSMA je transmembránový glykoprotein typu II s enzymatickou aktivitou folátové hydrolázy a karboxypeptidázy, který je vysoce exprimován u rakoviny prostaty, zejména u pokročilého, metastatického a kastrace-rezistentního onemocnění. Kromě zhoubných nádorů prostaty byla exprese PSMA pozorována také v neovaskulatuře různých solidních nádorů. Vzhledem k jeho silné expresi spojené s nádory a přístupné extracelulární doméně se PSMA stal hlavním cílem pro diagnostické zobrazování, radioligandovou terapii, terapie založené na protilátkách a přístupy založené na modifikovaných imunitních buňkách.

Buňky HEK293-PSMA se široce používají v onkologickém výzkumu a vývoji léčiv k charakterizaci monoklonálních protilátek namířených proti PSMA, konjugátů protilátek a léčiv, radiofarmak, bispecifických aktivátorů T-buněk, terapií CAR-T buňkami a inhibitorů malých molekul. Stabilní rekombinantní expresní systém umožňuje kvantitativní analýzu vazby ligandu, obsazení receptoru, hustoty antigenu, kinetiky internalizace a cytotoxicity závislé na cíli. Tyto buňky jsou obzvláště cenné pro hodnocení zobrazovacích sond zaměřených na PSMA a platform radioligandů, protože PSMA prochází účinnou internalizací po navázání ligandu. Mezi další aplikace patří vývoj testů pomocí průtokové cytometrie, studie vychytávání, reportérové testy, screening s vysokou propustností a validace systémů cíleného podávání pro léčbu rakoviny prostaty.

**Organism** Člověk

**Tissue** Fetální ledvina

## Charakteristika

**Age** Plod

**Gender** Ženy

**Morphology** Epitelu podobné

**Growth properties** Monovrstva, adherentní

## Regulační údaje

**Buňky HEK293-PSMA | 305992****Citation** HEK293-PSMA (katalogové číslo Cytion 305992)**Biosafety level** 1**NCBI\_TaxID** 9606**Biomolekulární data****Receptors expressed** PSMA**Zpracování****Culture Medium** RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l NaHCO<sub>3</sub> (číslo výrobku Cytion 820700a)**Supplements** Médium doplňte 10% FBS, 1 mM pyruvát sodným, 10 mM HEPES, 1% NEAA. Přidejte geneticin (G418-Sulfat), abyste dosáhli konečné koncentrace 1 mg/ml.**Dissociation Reagent** Trypsin-EDTA**Subculturing** Pro běžné kultivace adherentních buněk: Z adherentních buněk odsadte staré kultivační médium a promyjte je PBS, abyste odstranili veškeré zbývající médium. Po odsátí PBS přidejte odpovídající objem roztoku trypsinu/EDTA podle velikosti kultivační nádoby (např. 1 ml pro baňku T25, 3 ml pro baňku T75) a inkubujte při pokojové teplotě nebo 37 °C, dokud se buňky neoddělí (5-10 minut). Oddělování sledujte pod mikroskopem a v případě potřeby jemně poklepejte na nádobu, aby se buňky uvolnily. Po oddělení přidejte kompletní médium k inaktivaci trypsinu/EDTA, jemně buňky resuspendujte a alikvotní část buněčné suspenze přeneste do nové kultivační nádoby obsahující čerstvé médium. Umístěte nádobu do inkubátoru nastaveného na 37 °C s 5% CO<sub>2</sub> a každé 2 až 3 dny vyměňte médium.**Fluid renewal** 2 až 3krát týdně**Post-Thaw Recovery** Po rozmrazení rozdělte buňky v poměru 1:2 až 1:3 do baněk T25 a nechte je alespoň 24 hodin zotavit se z procesu zmrazování a přilnout.

Pro co nejlepší přilnutí a životaschopnost buněk po rozmrazení doporučujeme pro počáteční nasazení po kryozotavení použít baňky nebo destičky potažené kolagenem. Pro následnou běžnou kultivaci buněk není kolagenový povlak nutný.

## Buňky HEK293-PSMA | 305992

### Freeze medium

Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

### Thawing and Culturing Cells

1. Ověřte si, že lahvička zůstane při dodání hluboce zmrazená, protože buňky se přepravují na suchém ledu, aby se během přepravy udržely optimální teploty.
2. Po obdržení kryovialku buď okamžitě uložte při teplotě nižší než -150 °C, abyste zajistili zachování buněčné integrity, nebo přejděte ke kroku 3, pokud je nutná okamžitá kultivace.
3. Pro okamžitou kultivaci rychle rozmrazte lahvičku ponořením do vodní lázně o teplotě 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálním prostředkem a jemně ji míchejte po dobu 40-60 sekund, dokud nezůstane malý ledový chuchvalec.
4. Všechny další kroky provádějte za sterilních podmínek v průtokové digestoři a před otevřením kryovialku dezinfikujte 70% ethanolem.
5. Opatrně otevřete dezinfikovanou lahvičku a přeneste buněčnou suspenzi do 15 ml centrifugační zkušavky obsahující 8 ml kultivačního média o pokojové teplotě a jemně promíchejte.
6. Směs odstředíte při 300 x g po dobu 3 minut, aby se buňky oddělily, a supernatant obsahující zbytky mrazicího média opatrně zlikvidujte.
7. Pelety buněk jemně resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačního média. U adherentních buněk rozdělíte suspenzi mezi dvě kultivační baňky T25; u suspenzních kultur přeneste veškeré médium do jedné baňky T25, abyste podpořili účinnou interakci a růst buněk.
8. Dodržujte zavedené subkultivační protokoly pro kontinuální růst a udržování buněčné linie, čímž zajistíte spolehlivé výsledky experimentů.

### Incubation Atmosphere

37 °C, 5 %  $\text{CO}_2$ , zvlhčená atmosféra.

### Shipping Conditions

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

## Buňky HEK293-PSMA | 305992

### Storage Conditions

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

## Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

### Sterility

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy.

Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.