

Buňky HT-1080 | 300216

Obecné informace

Description

Buňky HT-1080, získané z pojivové tkáně 35letého muže s fibrosarkomem v roce 1972, jsou vzhledem ke své vysoce agresivní a invazivní povaze hojně využívány ke studiu mechanismů nádorové invazivity a metastazování.

Buňky HT-1080 byly hojně využívány ve studiích zahrnujících buněčnou migraci, testy invaze a testování protinádorových sloučenin. V oblasti terapeutického vývoje se buňky HT-1080 používají při screeningu protinádorových léčiv a při hodnocení jejich účinků na životaschopnost buněk, apoptózu a metastatický potenciál.

Buňky HT-1080 se rovněž používají ve výzkumu zaměřeném na extracelulární matrix, angiogenezi a úlohu různých genů a proteinů při progresi rakoviny. Buňky HT-1080 produkují matrixové metaloproteinázy (MMP), enzymy, které rozkládají složky extracelulární matrix a hrají klíčovou roli v nádorové invazi a metastazování. Díky této vlastnosti je buněčná linie HT-1080 užitečná pro studie zkoumající regulaci MMPs a jejich inhibitorů.

Lze shrnout, že buněčná linie HT-1080 s rozsáhlým využitím při studiu výzkumu rakoviny, modelů buněčné adheze, migrace a invaze, jakož i při vývoji terapeutických strategií, je i nadále cenným zdrojem ve výzkumu rakoviny.

Organism Člověk**Disease** Fibrosarkom**Synonyms** Ht-1080, HT 1080, HT1080, HT 1080.T

Charakteristika

Age 35 let**Gender** Muži**Ethnicity** Kavkazský**Morphology** Epitelu podobné**Cell type** Fibroblasty**Growth properties** Adherentní

Regulační údaje

Buňky HT-1080 | 300216

Citation HT-1080 (katalogové číslo Cytion 300216)**Biosafety level** 1**NCBI_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL_0317

Biomolekulární data

Isoenzymes G6PD, B**Oncogenes** Ras+**Tumorigenic** Ano, u imunosuprimovaných myší**Virus susceptibility** Poliovirus 1, vezikulární stomatitida (Indiana), RD114, virus kočičí leukémie (FeLV)**Reverse transcriptase** Negativní**Karyotype** Modální číslo: 2n=46, pseudodiploidní

Zpracování

Culture Medium EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/l NaHCO₃, w: EBSS (číslo článku Cytion 820100a)**Supplements** Doplněte médium o 10 % FBS a 1 % NEAA**Dissociation Reagent** Accutase

Subculturing Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstředte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhodte, buňky znovu rozpustte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.

Split ratio Doporučuje se poměr 1:4 až 1:8

Buňky HT-1080 | 300216

Seeding density 1×10^4 buněk/cm²

Fluid renewal Každé 3 dny

Post-Thaw Recovery Po rozmrazení naneste buňky v množství 5×10^4 buněk/cm² a nechte je alespoň 24 hodin zotavit se z procesu zmrazení a přilnout.

Freeze medium Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Thawing and Culturing Cells

1. Ověřte si, že lahvička zůstane při dodání hluboce zmrazená, protože buňky se přepravují na suchém ledu, aby se během přepravy udržely optimální teploty.
2. Po obdržení kryovialku buď okamžitě uložte při teplotě nižší než -150 °C, abyste zajistili zachování buněčné integrity, nebo přejděte ke kroku 3, pokud je nutná okamžitá kultivace.
3. Pro okamžitou kultivaci rychle rozmrazte lahvičku ponořením do vodní lázně o teplotě 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálním prostředkem a jemně ji míchejte po dobu 40-60 sekund, dokud nezůstane malý ledový chuchvalec.
4. Všechny další kroky provádějte za sterilních podmínek v průtokové digestoři a před otevřením kryovialku dezinfikujte 70% ethanolem.
5. Opatrně otevřete dezinfikovanou lahvičku a přeneste buněčnou suspenzi do 15 ml centrifugační zkumavky obsahující 8 ml kultivačního média o pokojové teplotě a jemně promíchejte.
6. Směs odstřeďte při 300 x g po dobu 3 minut, aby se buňky oddělily, a supernatant obsahující zbytky mrazicího média opatrně zlikvidujte.
7. Pelety buněk jemně resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačního média. U adherentních buněk rozdělte suspenzi mezi dvě kultivační baňky T25; u suspenzních kultur přeneste veškeré médium do jedné baňky T25, abyste podpořili účinnou interakci a růst buněk.
8. Dodržujte zavedené subkultivační protokoly pro kontinuální růst a udržování buněčné linie, čímž zajistíte spolehlivé výsledky experimentů.

Incubation Atmosphere 37 °C, 5 % CO₂, zvlhčená atmosféra.

Buňky HT-1080 | 300216**Flask Coating** Žádný**Freezing Procedure**

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

Shipping Conditions

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

Storage Conditions

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Kontrola kvality a molekulární analýza**Sterility**

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy.

Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálnímu kontrolám.

Profil STR**Amelogenin:** x,y**CSF1PO:** 12**D13S317:** 12,14**D16S539:** 9,12**D5S818:** 11,13**D7S820:** 9,10**TH01:** 6**TPOX:** 8**vWA:** 14,19**D3S1358:** 16**D21S11:** 28,30**D18S51:** 12,18**Penta E:** 5,15**Penta D:** 9,12**D8S1179:** 13,14**FGA:** 22,25

Buňky HT-1080 | 300216

Alely HLA

A*: '31:01:02, '68:01:01

B*: '27:05:02

C*: '02:02:02

DRB1*: '03:01:01, '04:07:01

DQA1*: '03:03:01, '05:01:01

DQB1*: '02:01:01, '03:01:01

DPB1*: '03:01:01, '04:01:01

E: '01:01, '01:03