

## Buňky PC-3M | 305061

## Obecné informace

## Description

Buněčná linie PC-3M je metastatická varianta odvozená od buněčné linie lidského adenokarcinomu prostaty PC-3, která byla původně izolována z kostních metastáz pacienta s karcinomem prostaty. PC-3M byla založena za účelem lepšího modelování metastatického potenciálu karcinomu prostaty. Tato buněčná linie vykazuje ve srovnání se svým rodičovským protějškem zvýšené migrační a invazivní schopnosti, což z ní činí důležitý nástroj pro studium molekulárních mechanismů metastazování a hodnocení terapeutických zásahů zaměřených na metastatický karcinom prostaty.

Buňky PC-3M byly použity v různých studiích in vitro a in vivo ke zkoumání progresu nádoru a mechanismů terapeutické rezistence. Prokázaly adaptabilitu na různé kultivační podmínky a vykazují robustní růst jak ve standardních kulturách, tak na zvířecích modelech. Linie PC-3M byla široce používána v xenograftových studiích, kde prokazuje schopnost vytvářet nádory a účinně metastazovat, což kopíruje klíčové charakteristiky pokročilého stadia karcinomu prostaty. To z ní činí neocenitelný model pro testování antimetastatických látek a objasnění cest, které vedou k metastatickému šíření.

Kromě metastatických vlastností byl PC-3M využit ke zkoumání interakcí mezi nádorovými buňkami a mikroprostředím, včetně úlohy stromálních buněk a složek extracelulární matrix při podpoře progresu rakoviny. Tato buněčná linie také exprimuje biomarkery relevantní pro rakovinu prostaty, jako je prostatický specifický antigen (PSA), a je vhodná pro genomické a proteomické profilování, což výzkumníkům umožňuje zkoumat molekulární cesty a identifikovat potenciální terapeutické cíle.

<b>Organism</b>	Člověk
<b>Tissue</b>	Prostata
<b>Disease</b>	Karcinom prostaty
<b>Metastatic site</b>	Kost
<b>Synonyms</b>	PC3-M, PC-3/M, PC3M, Pc3M

## Charakteristika

<b>Age</b>	62 let
<b>Gender</b>	Muži
<b>Morphology</b>	Epitelové
<b>Growth properties</b>	Adherentní

**Buňky PC-3M | 305061****Regulační údaje**

<b>Citation</b>	PC-3M (katalogové číslo Cytion 305061)
<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	9606
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_9555

**Biomolekulární data****Zpracování**

<b>Culture Medium</b>	Ham's F12K Medium, w: 2,0 mM L-Glutamin, w: 2,0 mM Pyruvát sodný, w: 2,5 g/l NaHCO <sub>3</sub> (číslo článku Cytion 820608a)
<b>Supplements</b>	Doplňte médium o 10% FBS
<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
<b>Subculturing</b>	Odstraňte staré médium z adheovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstředte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhodte, buňky znovu rozpustte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.
<b>Split ratio</b>	1:2 až 1:4
<b>Fluid renewal</b>	2 až 3krát týdně
<b>Freeze medium</b>	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryem.

**Buňky PC-3M | 305061****Thawing and  
Culturing Cells**

1. Ověřte si, že lahvička zůstane při dodání hluboce zmrazená, protože buňky se přepravují na suchém ledu, aby se během přepravy udržely optimální teploty.
2. Po obdržení kryovialku buď okamžitě uložte při teplotě nižší než -150 °C, abyste zajistili zachování buněčné integrity, nebo přejděte ke kroku 3, pokud je nutná okamžitá kultivace.
3. Pro okamžitou kultivaci rychle rozmrazte lahvičku ponořením do vodní lázně o teplotě 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálním prostředkem a jemně ji míchejte po dobu 40-60 sekund, dokud nezůstane malý ledový chuchvalec.
4. Všechny další kroky provádějte za sterilních podmínek v průtokové digestoři a před otevřením kryovialku dezinfikujte 70% ethanolem.
5. Opatrně otevřete dezinfikovanou lahvičku a přeneste buněčnou suspenzi do 15 ml centrifugační zkumavky obsahující 8 ml kultivačního média o pokojové teplotě a jemně promíchejte.
6. Směs odstředujte při 300 x g po dobu 3 minut, aby se buňky oddělily, a supernatant obsahující zbytky mrazicího média opatrně zlikvidujte.
7. Pelety buněk jemně resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačního média. U adherentních buněk rozdělte suspenzi mezi dvě kultivační baňky T25; u suspenzních kultur přeneste veškeré médium do jedné baňky T25, abyste podpořili účinnou interakci a růst buněk.
8. Dodržujte zavedené subkultivační protokoly pro kontinuální růst a udržování buněčné linie, čímž zajistíte spolehlivé výsledky experimentů.

**Incubation  
Atmosphere**

37 °C, 5 %  $\text{CO}_2$ , zvlhčená atmosféra.

**Flask Coating**

Žádný

**Freezing  
Procedure**

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

**Shipping  
Conditions**

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

## Buňky PC-3M | 305061

### Storage Conditions

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

## Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

### Sterility

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy.

Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

### Profil STR

**Amelogenin:** x,x  
**CSF1PO:** 11  
**D13S317:** 11  
**D16S539:** 11  
**D5S818:** 13  
**D7S820:** 8,11  
**TH01:** 6,7  
**TPOX:** 8,9  
**vWA:** 17  
**D3S1358:** 16  
**D21S11:** 29,31.2  
**D18S51:** 14,15  
**Penta E:** 10,17  
**Penta D:** 9  
**D8S1179:** 13  
**FGA:** 24  
**D6S1043:** 14,18  
**D2S1338:** 18,2  
**D12S391:** 21  
**D19S433:** 14