

## MDA-MB-468-celler | 300279

## Generel information

## Description

MDA-MB-468-cellelinjen er en veletableret human brystkræftcellelinje, der stammer fra pleuraeffusionen fra en voksen patient med metastatisk adenokarcinom. Disse celler er kendetegnet ved deres epiteliale morfologi og er kendt for deres høje grad af aneuploidi. MDA-MB-468-celler er østrogenreceptor-negative (ER-) og bruges ofte som model til at studere triple-negativ brystkræft (TNBC), en undertype af brystkræft, der mangler østrogenreceptor (ER), progesteronreceptor (PR) og HER2/neu-ekspression. Det gør MDA-MB-468 til et vigtigt redskab for forskning i kræftformer, der ikke reagerer på hormonbehandling eller HER2-målttede behandlinger.

Genetisk set udviser MDA-MB-468-celler mutationer i TP53-genet, som er almindeligt forekommende i forskellige former for kræft, og som spiller en vigtig rolle i reguleringen af cellegcyklus og apoptose. Cellelinjen viser også amplifikation af genet for den epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR), hvilket bidrager til dens anvendelighed i studiet af EGFR-signalvejen og dens betydning for kræftprogression og behandlingsresistens. Forskere bruger ofte MDA-MB-468-celler til at undersøge mekanismer for lægemiddelresistens, teste nye terapeutiske midler og udforske molekylærbiologien i aggressive brystkræftformer.

Ud over deres genetiske og fænotypiske egenskaber er MDA-MB-468-celler kendt for deres evne til at danne xenotransplantater i immunkompromitterede mus, hvilket gør dem til en værdifuld model for in vivo-undersøgelser af tumorvækst og metastase. Denne cellelinjes reaktion på forskellige kemoterapeutiske midler og målrettede terapier undersøges grundigt for at udvikle effektive behandlingsstrategier for TNBC. Samlet set er MDA-MB-468-cellelinjen en afgørende ressource til at fremme brystkræftforskningen, især i forbindelse med triple-negativ og EGFR-positive maligniteter.

## Organism

Menneske

## Tissue

Bryst

## Disease

Adenokarcinom

## Metastatic site

Pleural effusion

## Synonyms

MDA-MB 468, MDA-MB468, MDAMB468, MDA-468, MDA468, MB468, MD Anderson-Metastatic Breast-468

## Karakteristika

## Age

51 år

## Gender

Kvinde

## Ethnicity

Afrikansk

## Morphology

Epitelial

## MDA-MB-468-celler | 300279

## Growth properties

Vedhæftende

## Regulatoriske data

## Citation

MDA-MB-468 (Cytion katalognummer 300279)

## Biosafety level

1

## NCBI\_TaxID

9606

## CellosaurusAccession

CVCL\_0419

## Biomolekylære data

## Håndtering

## Culture Medium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glucose, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Sodium pyruvate, w: 1,2 g/L NaHCO<sub>3</sub> (Cytion artikelnummer 820400a)

## Supplements

Suppler mediet med 10% FBS

## Dissociation Reagent

Accutase

## Subculturing

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

## Fluid renewal

2 til 3 gange om ugen

## Freeze medium

Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

## MDA-MB-468-celler | 300279

### Thawing and Culturing Cells

1. Bekræft, at hætteglasset forbliver dybfrosset ved levering, da cellerne sendes på tøris for at opretholde optimale temperaturer under transport.
2. Ved modtagelsen skal du enten straks opbevare kryohætteglasset ved temperaturer under -150 °C for at sikre, at cellernes integritet bevares, eller gå videre til trin 3, hvis øjeblikkelig dyrkning er påkrævet.
3. Ved øjeblikkelig dyrkning optøs hætteglasset hurtigt ved at nedsænke det i et 37 °C varmt vandbad med rent vand og et antimikrobielt middel og røre forsigtigt i 40-60 sekunder, indtil der kun er en lille isklump tilbage.
4. Udfør alle efterfølgende trin under sterile forhold i en flowhætte, og desinficer kryovialet med 70 % ethanol, før det åbnes.
5. Åbn forsigtigt det desinficerede hætteglas, og overfør cellesuspensionen til et 15 ml centrifugerør, der indeholder 8 ml kulturmedium ved stuetemperatur, og bland forsigtigt.
6. Centrifuger blandingen ved 300 x g i 3 minutter for at adskille cellerne, og kassér omhyggeligt supernatanten, der indeholder resterende frysemedium.
7. Resuspender forsigtigt cellepelleten i 10 ml frisk dyrkningsmedium. For klæbende celler deles suspensionen mellem to T25-kulturkolber; for suspensionskulturer overføres alt mediet til en T25-kolbe for at fremme effektiv celleinteraktion og -vækst.
8. Overhold etablerede subkulturprotokoller for fortsat vækst og vedligeholdelse af cellelinjen, hvilket sikrer pålidelige eksperimentelle resultater.

### Incubation Atmosphere

37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , befugtet atmosfære.

### Flask Coating

Ingen

### Freezing Procedure

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

### Shipping Conditions

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

### MDA-MB-468-celler | 300279

---

#### **Storage Conditions**

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

### Kvalitetskontrol og molekylær analyse

#### **Sterility**

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder.

For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.