

**HepG2.2.15-celler | 305227****Generel information****Description**

HepG2.2.15-cellelinjen er et derivat af HepG2-cellelinjen, som stammer fra et humant hepatoblastom, en type leverkræft. Disse celler er især bemærkelsesværdige for deres evne til stabilt at udtrykke hepatitis B-virus (HBV)-partikler, hvilket gør dem uvurderlige i studiet af HBV-biologi og udviklingen af antivirale lægemidler. HepG2.2.15-celler bevarer mange af hepatocytternes egenskaber, herunder produktionen af proteiner som albumin og alfa-fetoprotein, som er afgørende for leverfunktionen. Derudover har de en polygonal form og danner tætte klynger, der ligner levervævetts struktur.

En af de primære anvendelser af HepG2.2.15-cellelinjen er forskning i HBV-replikation og -patogenese. Disse celler er transfekteret med HBV-genomet, hvilket fører til en kontinuerlig produktion af viruspartikler. Det gør dem til en ideel model til at studere HBV's livscyklus og effekten af forskellige antivirale midler. Forskere bruger HepG2.2.15-celler til at screene for potentielle terapeutiske forbindelser, undersøge virale indtrængnings- og replikationsmekanismer og forstå værtens immunrespons på HBV-infektion. Cellelinjens evne til at producere HBV gør det også muligt at studere virale mutationer og resistensmønstre, hvilket er afgørende for at udvikle effektive behandlinger.

**Organism**

Menneske

**Tissue**

Lever

**Disease**

Hepatoblastom

**Synonyms**

HEP-G2/2.2.15, Hep-G2/2215, HepG2/2215, HepG2-2.2.15, HepG2 2.2.15, HepG/2.2.15, HepG2(2.2.15), 2.2.15

**Karakteristika****Age**

15 år

**Gender**

Mand

**Ethnicity**

Kaukasisk

**Growth properties**

Vedhæftende

**Regulatoriske data****Citation**

HepG2.2.15 (Cytion katalognummer 305227)

**Biosafety level**

2

**HepG2.2.15-celler | 305227****NCBI\_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL\_L855**Biomolekylære data****Håndtering****Culture Medium** Ham's F12K Medium, m: 2,0 mM L-Glutamin, m: 2,0 mM Natriumpyruvat, m: 2,5 g/L NaHCO<sub>3</sub> (Cytion artikelnummer 820608a)**Supplements** Suppler mediet med 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspend cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.**Seeding density**  $5 \times 10^4$  celler/cm<sup>2</sup>**Freeze medium** Som kryopræservationsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

## HepG2.2.15-celler | 305227

### Thawing and Culturing Cells

1. Bekræft, at hætteglasset forbliver dybfrosset ved levering, da cellerne sendes på tøris for at opretholde optimale temperaturer under transport.
2. Ved modtagelsen skal du enten straks opbevare kryohætteglasset ved temperaturer under  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  for at sikre, at cellernes integritet bevares, eller gå videre til trin 3, hvis øjeblikkelig dyrkning er påkrævet.
3. Ved øjeblikkelig dyrkning optøs hætteglasset hurtigt ved at nedsænke det i et  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$  varmt vandbad med rent vand og et antimikrobielt middel og røre forsigtigt i 40-60 sekunder, indtil der kun er en lille isklump tilbage.
4. Udfør alle efterfølgende trin under sterile forhold i en flowhætte, og desinficer kryovialet med 70 % ethanol, før det åbnes.
5. Åbn forsigtigt det desinficerede hætteglas, og overfør cellesuspensionen til et 15 ml centrifugerør, der indeholder 8 ml kulturmedium ved stuetemperatur, og bland forsigtigt.
6. Centrifuger blandingen ved  $300 \times g$  i 3 minutter for at adskille cellerne, og kassér omhyggeligt supernatanten, der indeholder resterende frysemedium.
7. Resuspender forsigtigt cellepelleten i 10 ml frisk dyrkningsmedium. For klæbende celler deles suspensionen mellem to T25-kulturkolber; for suspensionskulturer overføres alt mediet til en T25-kolbe for at fremme effektiv celleinteraktion og -vækst.
8. Overhold etablerede subkulturprotokoller for fortsat vækst og vedligeholdelse af cellelinjen, hvilket sikrer pålidelige eksperimentelle resultater.

### Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , befugtet atmosfære.

### Flask Coating

Ingen

### Freezing Procedure

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca.  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

### Shipping Conditions

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca.  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

## HepG2.2.15-celler | 305227

### Storage Conditions

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

## Kvalitetskontrol / Genetisk profil / HLA

### Sterility

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder.

For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.