Product sheet

KMS-12-PE-celler | 300286

Generel information

Description	KMS-12-PE-cellelinjen, der blev etableret fra pleuraeffusionen fra den samme patient, adskiller sig markant fra KMS-12-BM i flere henseender. KMS-12-PE-celler repræsenterer et mere terminalt differentieret plasmacellestadie, hvilket fremgår af fraværet af CD20, men fortsat udtryk af CD38 og PCA-1. Et slående træk ved KMS-12-PE er dens evne til ektopisk at producere og udskille en spytlignende type amylase, både i patientens pleurale effusion og i kultur, hvilket gør den unik blandt humane myelomcellelinjer. Dette fænomen er forbundet med en kromosomdeletion nær det område, hvor amylasegenet er placeret, specifikt del(1)(p22→pter), som er observeret i en betydelig andel af KMS-12-PE-cellerne. På trods af disse forskellige forskelle deler både KMS-12-PE og KMS-12-BM den samme klonmarkør, translokationen t(11;14)(q13;q32), som er almindelig i myelomtilfælde. KMS-12-PE-celler viser dog færre kromosomale abnormiteter end KMS-12-BM og har tendens til at være hypodiploide. Ligesom KMS-12-BM producerer KMS-12-PE ikke immunglobuliner, hverken på overfladen eller i sekretorisk form, selv om cellerne har et veludviklet endoplasmatisk retikulum. Manglen på tumorigenicitet i begge cellelinjer, på trods af deres aggressive in vitro-vækst, og deres stabile langtidsproliferation i serumfrit medium gør dem til værdifulde værktøjer til undersøgelse af myelomets biologi, især i forbindelse med ikke-Ig-producerende myelomer.
Organism	Menneske
Tissue	Pleural effusion
Disease	Myelomatose
Synonyms	KMS 12 PE, KMS-12_PE, KMS-12PE, KMS12-PE, KMS12PE, Kawasaki Medical School-12-Pleural Effusion

Karakteristika

Age	64 år
Gender	Kvinde
Ethnicity	Japansk
Morphology	Runde celler
Cell type	B-celle
Growth properties	Suspension, enkeltceller og små klynger

Regulatoriske data

KMS-12-PE-celler | 300286

Citation	KMS-12-PE (Cytion katalognummer 300286)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1333

Biomolekylære data

Surface antigens	CD3 -, CD4 -, CD13 -, CD14 -, CD15 -, CD19 -, CD20 -, CD34 -, CD38 +, CD138 +, HLA-DR +, PCA-1 +
Tumorigenic	Ikke svulstfremkaldende i nøgne mus
Products	Ingen produktion af immunglobulin
Mutational profile	Translokation: t(11;14)(q13;q32)

Håndtering

Culture Medium	RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)
Supplements	Suppler mediet med 10% FBS
Subculturing	Vedligehold kulturerne ved regelmæssigt at tilføje eller udskifte mediet. Start kulturerne med en tæthed på 5 x 10^5 celler/ml og hold cellekoncentrationen inden for området 3 x 10^5 til 1 x 10^6 celler/ml for optimal vækst.
Seeding density	5 x 10^5 celler/ml
Freeze medium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

KMS-12-PE-celler | 300286

Thawing and Culturing Cells

1. Bekræft, at hætteglasset forbliver dybfrosset ved levering, da cellerne sendes på tøris for at opretholde optimale temperaturer under transport.
2. Ved modtagelsen skal du enten straks opbevare kryohætteglasset ved temperaturer under -150 °C for at sikre, at cellernes integritet bevares, eller gå videre til trin 3, hvis øjeblikkelig dyrkning er påkrævet.
3. Ved øjeblikkelig dyrkning optøs hætteglasset hurtigt ved at nedsænke det i et 37 °C varmt vandbad med rent vand og et antimikrobielt middel og røre forsigtigt i 40-60 sekunder, indtil der kun er en lille isklump tilbage.
4. Udfør alle efterfølgende trin under sterile forhold i en flowhætte, og desinficer kryovialet med 70 % ethanol, før det åbnes.
5. Åbn forsigtigt det desinficerede hætteglas, og overfør cellesuspensionen til et 15 ml centrifugerør, der indeholder 8 ml kulturmedium ved stuetemperatur, og bland forsigtigt.
6. Centrifuger blandingen ved 300 x g i 3 minutter for at adskille cellerne, og kassér omhyggeligt supernatanten, der indeholder resterende frysemedium.
7. Resuspender forsigtigt cellepelleten i 10 ml frisk dyrkningsmedium. For klæbende celler deles suspensionen mellem to T25-kulturkolber; for suspensionskulturer overføres alt mediet til en T25-kolbe for at fremme effektiv celleinteraktion og -vækst.
8. Overhold etablerede subkulturprotokoller for fortsat vækst og vedligeholdelse af cellelinjen, hvilket sikrer pålidelige eksperimentelle resultater.

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, befugtet atmosfære.
Flask Coating	Ingen
Freezing Procedure	Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.
Shipping Conditions	Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

Storage Conditions	For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Kvalitetskontrol og molekylær analyse

Sterility	Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.