

UM-SCC-127-celler | 305725

Generel information

Description

UM-SCC-127 er en human HNSCC-cellelinje fra UM-SCC-panelet ved University of Michigan. Som en del af den højere nummererede UM-SCC-serie er den en af de nyere etablerede linjer i denne samling. Linjen vokser adhærent med epitelagtig morfologi og udgør en model til sammenlignende molekulære og farmakologiske HNSCC-undersøgelser.

Kan anvendes til HNSCC-forskning, undersøgelser af lægemiddelfølsomhed, analyse af molekulære signalveje og eksperimenter med UM-SCC-panelet bestående af flere cellerlinjer. Egnede til farmakologiske analyser og xenotransplantationsmodeller.

Organism

Menneske

Tissue

Hoved og hals, mundhulen

Disease

Pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC)

Applications

Forskning i HNSCC; lægemiddelfølsomhed; analyse af molekulære signalveje; UM-SCC-panelundersøgelser; xenotransplantatmodeller

Karakteristika

Age

Uspecificeret alder

Gender

Køn uspecificeret

Ethnicity

Etnisk tilhørsforhold ikke angivet

Morphology

Epitel-lignende

Cell type

Epitheliale celler

Growth properties

Vedhæftende

Regulatoriske data

Citation

UM-SCC-127 (Cytion-katalognummer 305725)

Biosafety level

1

UM-SCC-127-celler | 305725

NCBI_TaxID	9606
------------	------

Biomolekylære data

Håndtering

Culture Medium	RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO ₃ (Cytion artikelnummer 820700a)
----------------	--

Supplements	Suppler mediet med 10% FBS
-------------	----------------------------

Dissociation Reagent	Accutase, 5 min., 37 °C
----------------------	-------------------------

Doubling time	ca. 24 til 48 timer
---------------	---------------------

Subculturing	Fjern mediet, vask med PBS uden calcium og magnesium, tilsæt Accutase, inkuber i 8–10 minutter ved stuetemperatur, resuspender i mediet, centrifuger ved 300×g i 3 minutter, fjern supernatanten, og udså igen i frisk medium.
--------------	--

Split ratio	1 til 5
-------------	---------

Seeding density	1 til 3×10^4 cell ^{er} /cm ²
-----------------	---

Fluid renewal	Hver 2. til 3. dag
---------------	--------------------

Freeze medium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium + 10 % DMSO for at opnå tilstrækkelig levedygtighed efter optøning.
---------------	---

UM-SCC-127-celler | 305725

Thawing and Culturing Cells

1. Bekræft, at hætteglasset forbliver dybfrosset ved levering, da cellerne sendes på tør is for at opretholde optimale temperaturer under transport.
2. Ved modtagelse skal du enten opbevare kryohætteglasset med det samme ved temperaturer under -150 °C for at sikre, at cellernes integritet bevares, eller fortsætte til trin 3, hvis øjeblikkelig dyrkning er påkrævet.
3. Ved øjeblikkelig dyrkning optøs hætteglasset hurtigt ved at nedsænke det i et 37 °C varmt vandbad med rent vand og et antimikrobielt middel og røre forsigtigt i 40-60 sekunder, indtil der er en lille isklump tilbage.
4. Udfør alle efterfølgende trin under sterile forhold i en flowhætte, og desinficer kryoviallet med 70 % ethanol, før det åbnes.
5. Åbn forsigtigt det desinficerede hætteglas, og overfør cellesuspensionen til et 15 ml centrifugerør, der indeholder 8 ml kulturmedium ved stuetemperatur, og bland forsigtigt.
6. Centrifuger blandingen ved 200 x g i 5 minutter, og kassér omhyggeligt supernatanten, der indeholder frysemedium.
7. Følg proceduren beskrevet under Post-Thaw Recovery

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , befugtet atmosfære.

Shipping Conditions

Kryopræservede cellerlinjer sendes på tør is i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

Storage Conditions

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Kvalitetskontrol og molekylær analyse