

## C-33 A Cellar | 305072

## Generel information

## Description

C-33 A-celler stammer fra livmoderhalsvæv fra en 66-årig kaukasisk kvinde, der var diagnosticeret med livmoderkræft. Denne cellelinje er kendetegnet ved en unik genetisk ændring i TP53-genet, hvor en punktmutation ved codon 273 resulterer i en arginin til cysteinsubstitution, hvilket fører til forhøjet ekspresion af p53-proteinet. Denne mutation spiller en afgørende rolle i cellernes patofysiologi, idet den påvirker deres vækstegenskaber og tumorpotentiale.

Især C-33 A-celler er bekræftet at være tumorigeniske. Når de introduceres i immundefekte nøgenmus, har disse celler evnen til at danne udifferentierede karcinomer, hvilket fremhæver deres anvendelighed i kræftforskning, især i undersøgelser, der har til formål at forstå mekanismerne for tumorinitiering og progression i livmoderhalskræft. Desuden er disse celler negative for både DNA og RNA fra human papillomavirus (HPV), hvilket adskiller dem fra mange andre cellelinjer til livmoderhalskræft, som ofte bærer HPV-integrationer. Dette aspekt gør C-33 A-celler særligt værdifulde til at studere livmoderhalskræft, der udvikler sig uafhængigt af HPV-infektion, og giver indsigt i alternative veje til kræftfremkaldelse.

**Organism** Menneske

**Tissue** Livmoderhalsen

**Disease** Pladecellekarcinom i livmoderhalsen

**Synonyms** C33A, C33a, C33-A, C-33-A, C-33A, C33

## Karakteristika

**Age** 66 år

**Gender** Kvinde

**Morphology** Epitelial

**Growth properties** Vedhæftende

## Regulatoriske data

**Citation** C33A (Cytion katalognummer 305072)

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 9606

## C-33 A Cellar | 305072

CellosaurusAccession CVCL\_1094

## Biomolekylære data

**Protein expression** Onkogener: P53 , Prb**Tumorigenic** Yees

## Håndtering

**Culture Medium** EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO<sub>3</sub>, w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)**Supplements** Suppler mediet med 10% FBS og 1% NEAA**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspendere cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.**Fluid renewal** 2 til 3 gange om ugen**Freeze medium** Som kryopræservationsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

## C-33 A Cellar | 305072

### Thawing and Culturing Cells

1. Bekræft, at hætteglasset forbliver dybfrosset ved levering, da cellerne sendes på tøris for at opretholde optimale temperaturer under transport.
2. Ved modtagelsen skal du enten straks opbevare kryohætteglasset ved temperaturer under  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  for at sikre, at cellernes integritet bevares, eller gå videre til trin 3, hvis øjeblikkelig dyrkning er påkrævet.
3. Ved øjeblikkelig dyrkning optøs hætteglasset hurtigt ved at nedsænke det i et  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$  varmt vandbad med rent vand og et antimikrobielt middel og røre forsigtigt i 40-60 sekunder, indtil der kun er en lille isklump tilbage.
4. Udfør alle efterfølgende trin under sterile forhold i en flowhætte, og desinficer kryovialet med 70 % ethanol, før det åbnes.
5. Åbn forsigtigt det desinficerede hætteglas, og overfør cellesuspensionen til et 15 ml centrifugerør, der indeholder 8 ml kulturmedium ved stuetemperatur, og bland forsigtigt.
6. Centrifuger blandingen ved  $300 \times g$  i 3 minutter for at adskille cellerne, og kassér omhyggeligt supernatanten, der indeholder resterende frysemedium.
7. Resuspender forsigtigt cellepelleten i 10 ml frisk dyrkningsmedium. For klæbende celler deles suspensionen mellem to T25-kulturkolber; for suspensionskulturer overføres alt mediet til en T25-kolbe for at fremme effektiv celleinteraktion og -vækst.
8. Overhold etablerede subkulturprotokoller for fortsat vækst og vedligeholdelse af cellelinjen, hvilket sikrer pålidelige eksperimentelle resultater.

### Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , befugtet atmosfære.

### Flask Coating

Ingen

### Freezing Procedure

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca.  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

### Shipping Conditions

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca.  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

## C-33 A Cellar | 305072

### Storage Conditions

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

## Kvalitetskontrol / Genetisk profil / HLA

### Sterility

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder.

For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.