

**B-CPAP-celler | 305081****Generel information****Description**

B-CPAP er en human papillær skjoldbruskkirtelcarcinom-cellelinje, der blev etableret fra den primære tumor hos en 74-årig kvinde. Cellelinjen udviser epitel-lignende morfologi og bruges ofte i forskning til at studere skjoldbruskkirtelkræftbiologi, herunder mekanismer for tumorigenese og metastase. B-CPAP-celler er bemærkelsesværdige, fordi de har en BRAF V600E-mutation, som er en almindelig genetisk ændring, der er forbundet med aggressive kræftformer i skjoldbruskkirtlen og fungerer som en kritisk model til evaluering af BRAF-hæmmere som terapeutiske midler.

Ud over BRAF-mutationen udtrykker B-CPAP-celler skjoldbruskkirtelspecifikke markører som thyroglobulin og thyroideastimulerende hormonreceptor, hvilket gør dem til en værdifuld model til undersøgelse af skjoldbruskkirtlens funktion og patologi. De er blevet brugt i vid udstrækning i undersøgelser af de signalveje, der er involveret i udviklingen af kræft i skjoldbruskkirtlen, herunder aktivering af MAPK/ERK-vejen. Disse celler anvendes også i undersøgelser af lægemiddelresistens og apoptose, hvilket giver indsigt i de mekanismer, der kan understøtte terapeutiske fejl i behandlinger af skjoldbruskkirtelkræft.

**Organism** Menneske

**Tissue** Skjoldbruskkirtlen

**Disease** Karcinom i skjoldbruskkirtlen

**Synonyms** BC-PAP, BCPAP

**Karakteristika**

**Age** 76 år

**Gender** Kvinde

**Ethnicity** Europæisk

**Morphology** Epitelial

**Growth properties** Vedhæftende

**Regulatoriske data**

**Citation** B-CPAP (Cytion katalognummer 305081)

**Biosafety level** 1

**B-CPAP-celler | 305081****NCBI\_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL\_0153**Biomolekylære data****Håndtering****Culture Medium** RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO<sub>3</sub> (Cytion artikelnummer 820700a)**Supplements** Suppler mediet med 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Doubling time** 30 timer**Subculturing** Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspendere cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.**Fluid renewal** 2 til 3 gange om ugen**Freeze medium** Som kryopræservationsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

## B-CPAP-celler | 305081

### Thawing and Culturing Cells

1. Bekræft, at hætteglasset forbliver dybfrosset ved levering, da cellerne sendes på tøris for at opretholde optimale temperaturer under transport.
2. Ved modtagelsen skal du enten straks opbevare kryohætteglasset ved temperaturer under  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  for at sikre, at cellernes integritet bevares, eller gå videre til trin 3, hvis øjeblikkelig dyrkning er påkrævet.
3. Ved øjeblikkelig dyrkning optøs hætteglasset hurtigt ved at nedsænke det i et  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$  varmt vandbad med rent vand og et antimikrobielt middel og røre forsigtigt i 40-60 sekunder, indtil der kun er en lille isklump tilbage.
4. Udfør alle efterfølgende trin under sterile forhold i en flowhætte, og desinficer kryovialet med 70 % ethanol, før det åbnes.
5. Åbn forsigtigt det desinficerede hætteglas, og overfør cellesuspensionen til et 15 ml centrifugerør, der indeholder 8 ml kulturmedium ved stuetemperatur, og bland forsigtigt.
6. Centrifuger blandingen ved  $300 \times g$  i 3 minutter for at adskille cellerne, og kassér omhyggeligt supernatanten, der indeholder resterende frysemedium.
7. Resuspender forsigtigt cellepelleten i 10 ml frisk dyrkningsmedium. For klæbende celler deles suspensionen mellem to T25-kulturkolber; for suspensionskulturer overføres alt mediet til en T25-kolbe for at fremme effektiv celleinteraktion og -vækst.
8. Overhold etablerede subkulturprotokoller for fortsat vækst og vedligeholdelse af cellelinjen, hvilket sikrer pålidelige eksperimentelle resultater.

### Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , befugtet atmosfære.

### Flask Coating

Ingen

### Freezing Procedure

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca.  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

### Shipping Conditions

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca.  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

## B-CPAP-celler | 305081

### Storage Conditions

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

## Kvalitetskontrol / Genetisk profil / HLA

### Sterility

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder.

For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.