Product sheet

UM-SCC-123-Zellen | 305722

Allgemeine Informationen

Description	UM-SCC-123 ist eine humane HNSCC-Zelllinie aus dem UM-SCC-Panel der University of Michigan, die adhärent wächst und eine epithelähnliche Morphologie aufweist. Als Teil der UM-SCC-Serie für die Mundhöhle bietet sie ein definiertes Modell für vergleichende präklinische Studien. Einsetzbar für Studien zur Arzneimittelempfindlichkeit bei HNSCC, zur Strahlentherapie, zu den EGFR-/PI3K-Signalwegen sowie für Vergleichsstudien im Rahmen des UM-SCC-Panels. Geeignet für pharmakologisches Screening und Xenotransplantat-Experimente.
Organism	Menschen
Tissue	Kopf und Hals, Mundhöhle
Disease	Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses (HNSCC)
Applications	HNSCC-Forschung; Arzneimittelsensitivität; Strahlenreaktion; UM-SCC-Panel-Studien; Xenotransplantatmodelle

Merkmale

Age	Alter nicht spezifiziert
Gender	Geschlecht nicht spezifiziert
Ethnicity	Ethnische Zugehörigkeit nicht angegeben
Morphology	Epithelähnlich
Cell type	Epithelzellen
Growth properties	Adhärent

Regulatorische Daten

Citation	UM-SCC-123 (Cytion-Katalognummer 305722)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

UM-SCC-123-Zellen | 305722

Biomolekulare Daten

Handhabung

Culture Medium	DMEM, w: 4,5 g/L Glucose, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Natriumpyruvat (Cytion-Artikelnummer 820300a)
Supplements	Ergänzen Sie das Medium mit 10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	ca. 24 bis 48 Stunden
Subculturing	Medium entfernen, mit PBS ohne Kalzium und Magnesium waschen, mit Accutase bedecken, 8–10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren, in Medium resuspendieren, 3 Minuten bei 300×g zentrifugieren, Überstand verwerfen, in frisches Medium ausplattieren.
Split ratio	1 bis 5
Seeding density	1 bis 3 × 10^4 Zellen/cm^2
Fluid renewal	Alle 2 bis 3 Tage
Freeze medium	Als Kryokonservierungsmedium verwenden wir vollständiges Wachstumsmedium + 10 % DMSO, um eine angemessene Lebensfähigkeit nach dem Auftauen zu gewährleisten.

UM-SCC-123-Zellen | 305722

Thawing and Culturing Cells	1. Vergewissern Sie sich, dass das Fläschchen bei der Lieferung tiefgefroren ist, da die Zellen auf Trockeneis versandt werden, um während des Transports optimale Temperaturen zu erhalten. 2. Lagern Sie das Kryofläschchen nach Erhalt entweder sofort bei Temperaturen unter -150 °C, um die Unversehrtheit der Zellen zu gewährleisten, oder fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn eine sofortige Kultivierung erforderlich ist. 3. Für eine sofortige Kultivierung tauen Sie das Fläschchen schnell auf, indem Sie es in ein 37°C warmes Wasserbad mit sauberem Wasser und einem antimikrobiellen Mittel eintauchen und 40-60 Sekunden lang vorsichtig schütteln, bis ein kleiner Eisklumpen zurückbleibt. 4. Führen Sie alle weiteren Schritte unter sterilen Bedingungen in einer Abzugshaube durch und desinfizieren Sie das Kryo-Fläschchen vor dem Öffnen mit 70%igem Ethanol. 5. Das desinfizierte Fläschchen vorsichtig öffnen und die Zellsuspension unter vorsichtigem Mischen in ein 15-ml-Zentrifugenröhrchen mit 8 ml Kulturmedium bei Raumtemperatur überführen. 6. Die Mischung 5 Minuten lang bei 200 x g zentrifugieren und den Überstand mit dem Gefriermedium vorsichtig verwerfen. 7. Befolgen Sie das unter Wiederherstellung nach dem Auftauen beschriebene Verfahren
Incubation Atmosphere	37°C, 5%$_{CO2}$, befeuchtete Atmosphäre.
Shipping Conditions	Kryokonservierte Zelllinien werden auf Trockeneis in einer validierten, isolierten Verpackung mit ausreichend Kühlmittel versandt, um während des gesamten Transports eine Temperatur von etwa -78 °C aufrechtzuerhalten. Prüfen Sie den Behälter bei Erhalt sofort und bringen Sie die Fläschchen unverzüglich in ein geeignetes Lager.
Storage Conditions	Zur Langzeitkonservierung werden die Fläschchen in flüssigem Stickstoff bei etwa -150 bis -196 °C gelagert. Eine Lagerung bei -80 °C ist nur als kurzer Zwischenschritt vor der Überführung in flüssigen Stickstoff akzeptabel.

Qualitätskontrolle und molekulare Analyse