

WI-38-Zellen | 300428

Allgemeine Informationen

Description

Bitte beachten Sie: Die WI-38 Zelllinie kann nicht mehr erworben werden. Unser Bestand hat die Seneszenz erreicht und kann daher nicht mehr verkauft werden. Wir bieten jedoch weiterhin eine immortalisierte Variante dieser Zelllinie an, WI 38VA13 Subline 2RA (Katalog-Nr. 300421).

Die WI-38-Zelllinie, die aus dem fetalen Lungengewebe eines 3 Monate alten Fötus gewonnen wurde, der 1962 in Schweden bei einem freiwilligen Schwangerschaftsabbruch abgetrieben wurde, ist ein Meilenstein in der medizinischen Wissenschaft, insbesondere in der Impfstoffherstellung. WI-38-Zellen haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen eine Vielzahl von virusbedingten Infektionskrankheiten gespielt, darunter Poliomyelitis, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Herpes zoster, Adenovirus, Tollwut und Hepatitis A, wodurch die mit diesen Krankheiten verbundene Morbidität erheblich reduziert werden konnte.

WI-38-Zellen wurden bei der Herstellung mehrerer wichtiger Impfstoffe verwendet, wie z. B. der Röteln- und Hepatitis-A-Impfstoffe von Merck, des Tollwutimpfstoffs Imovax von Sanofi Pasteur und des vom US-Militär verwendeten Adenovirus-Impfstoffs, was ihre wichtige Rolle für die öffentliche Gesundheit unterstreicht. Diese Zellen, die sich durch ihren Fibroblasten-Zelltyp und ihre hervorragende Biokompatibilität auszeichnen, bieten ein optimales Umfeld für die Kultivierung von Viren und die Herstellung von humanen Virusimpfstoffen.

Als menschliche diploide Zelllinie mit einer endlichen Lebensdauer von etwa 50 Populationsverdoppelungen und einer Verdoppelungszeit von etwa 24 Stunden wurden WI-38-Zellen in der biologischen Forschung ausgiebig verwendet, u. a. zur Untersuchung von Zellalterung, Krebs und Genetik. WI-38-Zellen haben sich auch im Bereich der Virologie bewährt, insbesondere bei der Kultivierung und Untersuchung von menschlichen Viren. Diese Zellen bieten ein günstiges Umfeld für die Kultivierung von Viren, die aus klinischen Proben entnommen wurden, was für die Entwicklung von Impfstoffen und für ein besseres Verständnis des viralen Verhaltens und der Genetik unerlässlich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die WI-38-Zellen mit ihren umfangreichen Anwendungen in der Impfstoffherstellung ein Eckpfeiler im Bereich der Virologie bleiben. Ihr Beitrag zur Entwicklung von aus Zellen gewonnenen Impfstoffen und die Förderung von Primärzellen in der wissenschaftlichen Forschung unterstreicht ihre unschätzbare Rolle bei der Verbesserung der menschlichen Gesundheit weltweit.

Organism Menschen

Tissue Lunge

Synonyms Wi-38, WI38, Wistar Institute-38, AG06814E, AG06814G, AG06814H, AG06814-J, AG06814J, AG06814-M, AG06814-N

Merkmale

Age 3 Monate Trächtigkeit

Gender Weiblich

Ethnicity Kaukasisch

WI-38-Zellen | 300428

Morphology Epithelähnlich

Cell type Fibroblasten

Growth properties Adhärent

Regulatorische Daten

Citation WI 38 (Cytion-Katalognummer 300428)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_0579

Biomolekulare Daten

Handhabung

Culture Medium EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO₃, w: EBSS (Cytion-Artikelnummer 820100a)

Supplements Ergänzen Sie das Medium mit 10% FBS und 1% NEAA

Dissociation Reagent Accutase

Subculturing Entfernen Sie das alte Medium von den adhären Zellen und waschen Sie sie mit PBS, das kein Kalzium und Magnesium enthält. Für T25-Kolben 3-5 ml PBS und für T75-Kolben 5-10 ml verwenden. Anschließend werden die Zellen vollständig mit Accutase bedeckt, wobei 1-2 ml für T25-Kolben und 2,5 ml für T75-Kolben verwendet werden. Lassen Sie die Zellen 8-10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren, um sie abzulösen. Nach der Inkubation mischen Sie die Zellen vorsichtig mit 10 ml Medium, um sie zu resuspendieren, und zentrifugieren sie dann 3 Minuten lang bei 300xg. Den Überstand verwerfen, die Zellen in frischem Medium resuspendieren und in neue Kolben überführen, die bereits frisches Medium enthalten.

Freeze medium Als Kryokonservierungsmedium verwenden wir komplettes Wachstumsmedium (einschließlich FBS) + 10 % DMSO für eine angemessene Lebensfähigkeit nach dem Auftauen oder CM-1 (Cytion Katalognummer 800100), das optimierte Osmoprotektoren und Stoffwechselstabilisatoren enthält, um die Erholung zu verbessern und kryoinduzierten Stress zu reduzieren.

WI-38-Zellen | 300428

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Vergewissern Sie sich, dass das Fläschchen bei der Lieferung tiefgefroren ist, da die Zellen auf Trockeneis versandt werden, um während des Transports optimale Temperaturen zu erhalten.
2. Lagern Sie das Kryofläschchen nach Erhalt entweder sofort bei Temperaturen unter -150 °C, um die Unversehrtheit der Zellen zu gewährleisten, oder fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn eine sofortige Kultivierung erforderlich ist.
3. Für eine sofortige Kultivierung tauen Sie das Fläschchen schnell auf, indem Sie es in ein 37°C warmes Wasserbad mit sauberem Wasser und einem antimikrobiellen Mittel eintauchen und 40-60 Sekunden lang vorsichtig schütteln, bis ein kleiner Eisklumpen zurückbleibt.
4. Führen Sie alle weiteren Schritte unter sterilen Bedingungen in einer Abzugshaube durch und desinfizieren Sie das Kryo-Fläschchen vor dem Öffnen mit 70%igem Ethanol.
5. Das desinfizierte Fläschchen vorsichtig öffnen und die Zellsuspension unter vorsichtigem Mischen in ein 15-ml-Zentrifugenröhrchen mit 8 ml Kulturmedium bei Raumtemperatur überführen.
6. Zentrifugieren Sie das Gemisch 3 Minuten lang bei 300 x g, um die Zellen abzutrennen, und werfen Sie den Überstand mit dem restlichen Gefriermedium vorsichtig.
7. Das Zellpellet vorsichtig in 10 ml frischem Kulturmedium resuspendieren. Bei adhären Zellen die Suspension auf zwei T25-Kulturflaschen aufteilen; bei Suspensionskulturen das gesamte Medium in eine T25-Flasche überführen, um eine effektive Zellinteraktion und ein effektives Wachstum zu fördern.
8. Halten Sie sich an die festgelegten Subkulturprotokolle, um ein kontinuierliches Wachstum und die Aufrechterhaltung der Zelllinie zu gewährleisten und zuverlässige Versuchsergebnisse zu erzielen.

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO₂, befeuchtete Atmosphäre.

Flask Coating

Keine

**Freezing
Procedure**

Kryokonservierte Zelllinien werden auf Trockeneis in einer validierten, isolierten Verpackung mit ausreichend Kühlmittel versandt, um während des gesamten Transports eine Temperatur von etwa -78 °C aufrechtzuerhalten. Prüfen Sie den Behälter bei Erhalt sofort und bringen Sie die Fläschchen unverzüglich in ein geeignetes Lager.

WI-38-Zellen | 300428

**Shipping
Conditions**

Kryokonservierte Zelllinien werden auf Trockeneis in einer validierten, isolierten Verpackung mit ausreichend Kühlmittel versandt, um während des gesamten Transports eine Temperatur von etwa -78 °C aufrechtzuerhalten. Prüfen Sie den Behälter bei Erhalt sofort und bringen Sie die Fläschchen unverzüglich in ein geeignetes Lager.

**Storage
Conditions**

Zur Langzeitkonservierung werden die Fläschchen in flüssigem Stickstoff bei etwa -150 bis -196 °C gelagert. Eine Lagerung bei -80 °C ist nur als kurzer Zwischenschritt vor der Überführung in flüssigen Stickstoff akzeptabel.

Qualitätskontrolle / Genetisches Profil / HLA

Sterility

Eine Kontamination mit Mykoplasmen wird sowohl durch PCR-basierte Assays als auch durch lumineszenzbasierte Mykoplasmen-Nachweisverfahren ausgeschlossen.

Um sicherzustellen, dass keine Kontamination mit Bakterien, Pilzen oder Hefen vorliegt, werden die Zellkulturen täglich visuell überprüft.

STR-Profil

Amelogenin: x,x

HLA-Allele

A*: '02:05:01, '68:01:01
B*: '08:01:01, '58:01:01
C*: '07:01:01, '07:18:01
DRB1*: '11:01:01, '13:02:01
DQA1*: '01:02:01, '05:05:01
DQB1*: '03:01:01, '06:09:01
DPB1*: '03:01:01, '04:01:01
E: '01:01:01, '01:03:01