

## NFS-60-Zellen | 400301

## Allgemeine Informationen

**Description** NFS-60 ist eine myeloblastische Zelllinie der Maus, die aus leukämischen Zellen gewonnen wurde, die nach Infektion von erwachsenen (NFS x DBA/2) F1-Mäusen mit dem Cas Br-M-Mausleukämievirus entstanden sind. Die NFS-60-Zellen sind für ihr Wachstum und die Aufrechterhaltung ihrer Lebensfähigkeit in vitro auf IL3 angewiesen. Diese Zellen werden zum Testen von murinem und humanem G-CSF verwendet. Diese bipotente hämatopoetische Zelllinie der Maus reagiert auf IL-3, GM-CSF, G-CSF und Erythropoietin.

**Organism** Maus

**Tissue** Blut

**Disease** Leukämie

**Synonyms** M-NFS-60, NFS 60, NFS60

## Merkmale

**Breed/Subspecies** NFS x DBA/2

**Cell type** Lymphoblasten

**Growth properties** Aufhängung

## Regulatorische Daten

**Citation** NFS-60 (Cytion Katalognummer 400301)

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 10090

**CellosaurusAccession** CVCL\_3543

## Biomolekulare Daten

## Handhabung

**Culture Medium** RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiles Glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO<sub>3</sub> (Cytion-Artikelnummer 820700a)

## NFS-60-Zellen | 400301

**Supplements** Ergänzen Sie das Medium mit 10% FBS, 1 ng/mL IL-3

**Subculturing** Halten Sie die Kulturen aufrecht, indem Sie regelmäßig Medium hinzufügen oder austauschen. Beginnen Sie die Kulturen mit einer Dichte von  $5 \times 10^5$  Zellen/ml und halten Sie die Zellkonzentration im Bereich von  $3 \times 10^5$  bis  $1 \times 10^6$  Zellen/ml, um ein optimales Wachstum zu erzielen.

**Seeding density** Beginnen Sie die Kulturen mit  $5 \times 10^4$  lebensfähigen Zellen/ml.

**Fluid renewal** 2 bis 3 Mal pro Woche

**Freeze medium** Als Kryokonservierungsmedium verwenden wir komplettes Wachstumsmedium (einschließlich FBS) + 10 % DMSO für eine angemessene Lebensfähigkeit nach dem Auftauen oder CM-1 (Cytion Katalognummer 800100), das optimierte Osmoprotektoren und Stoffwechselstabilisatoren enthält, um die Erholung zu verbessern und kryoinduzierten Stress zu reduzieren.

### Thawing and Culturing Cells

1. Vergewissern Sie sich, dass das Fläschchen bei der Lieferung tiefgefroren ist, da die Zellen auf Trockeneis versandt werden, um während des Transports optimale Temperaturen zu erhalten.
2. Lagern Sie das Kryofläschchen nach Erhalt entweder sofort bei Temperaturen unter  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ , um die Unversehrtheit der Zellen zu gewährleisten, oder fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn eine sofortige Kultivierung erforderlich ist.
3. Für eine sofortige Kultivierung tauen Sie das Fläschchen schnell auf, indem Sie es in ein  $37^{\circ}\text{C}$  warmes Wasserbad mit sauberem Wasser und einem antimikrobiellen Mittel eintauchen und 40-60 Sekunden lang vorsichtig schütteln, bis ein kleiner Eisklumpen zurückbleibt.
4. Führen Sie alle weiteren Schritte unter sterilen Bedingungen in einer Abzugshaube durch und desinfizieren Sie das Kryo-Fläschchen vor dem Öffnen mit 70%igem Ethanol.
5. Das desinfizierte Fläschchen vorsichtig öffnen und die Zellsuspension unter vorsichtigem Mischen in ein 15-ml-Zentrifugenröhrchen mit 8 ml Kulturmedium bei Raumtemperatur überführen.
6. Zentrifugieren Sie das Gemisch 3 Minuten lang bei  $300 \times g$ , um die Zellen abzutrennen, und werfen Sie den Überstand mit dem restlichen Gefriermedium vorsichtig.
7. Das Zellpellet vorsichtig in 10 ml frischem Kulturmedium resuspendieren. Bei adhären Zellen die Suspension auf zwei T25-Kulturflaschen aufteilen; bei Suspensionskulturen das gesamte Medium in eine T25-Flasche überführen, um eine effektive Zellinteraktion und ein effektives Wachstum zu fördern.
8. Halten Sie sich an die festgelegten Subkulturprotokolle, um ein kontinuierliches Wachstum und die Aufrechterhaltung der Zelllinie zu gewährleisten und zuverlässige Versuchsergebnisse zu erzielen.

## NFS-60-Zellen | 400301

**Incubation Atmosphere** 37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , befeuchtete Atmosphäre.

**Flask Coating** Keine

**Freezing Procedure** Kryokonservierte Zelllinien werden auf Trockeneis in einer validierten, isolierten Verpackung mit ausreichend Kühlmittel versandt, um während des gesamten Transports eine Temperatur von etwa -78 °C aufrechtzuerhalten. Prüfen Sie den Behälter bei Erhalt sofort und bringen Sie die Fläschchen unverzüglich in ein geeignetes Lager.

**Shipping Conditions** Kryokonservierte Zelllinien werden auf Trockeneis in einer validierten, isolierten Verpackung mit ausreichend Kühlmittel versandt, um während des gesamten Transports eine Temperatur von etwa -78 °C aufrechtzuerhalten. Prüfen Sie den Behälter bei Erhalt sofort und bringen Sie die Fläschchen unverzüglich in ein geeignetes Lager.

**Storage Conditions** Zur Langzeitkonservierung werden die Fläschchen in flüssigem Stickstoff bei etwa -150 bis -196 °C gelagert. Eine Lagerung bei -80 °C ist nur als kurzer Zwischenschritt vor der Überführung in flüssigen Stickstoff akzeptabel.

## Qualitätskontrolle / Genetisches Profil / HLA

**Sterility** Eine Kontamination mit Mykoplasmen wird sowohl durch PCR-basierte Assays als auch durch lumineszenzbasierte Mykoplasmen-Nachweisverfahren ausgeschlossen.

Um sicherzustellen, dass keine Kontamination mit Bakterien, Pilzen oder Hefen vorliegt, werden die Zellkulturen täglich visuell überprüft.

**NFS-60-Zellen | 400301**

---

**STR-Profil**

M\_18-3: 16  
M\_4-2: 19,3,20,3  
M\_6-7: 11,12  
M\_3-2: 13,14  
M\_19-2: 11,12  
M\_7-1: 28,29  
M\_1-1: 10,16  
M\_8-1: 15,16  
M\_2-1: 9,16  
M\_15-3: 20,3,21,3  
M\_6-4: 15,3,18  
M\_11-2: 17,18  
M\_1-2: 17  
M\_17-2: 13,15  
M\_12-1: 16,2  
M\_5-5: 14,15  
M\_X-1: 25,27  
M\_13-1: 13,14,2  
Human D4/D8: -