

Κύτταρα 4T1-GFP | 305625

Γενικές πληροφορίες

Description

Το 4T1-GFP είναι ένα γενετικά τροποποιημένο παράγωγο της ποντικής κυτταρικής σειράς καρκινώματος του μαστού 4T1, το οποίο εκφράζει συνεχώς πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (GFP), επιτρέποντας την απεικόνιση και την παρακολούθηση των καρκινικών κυττάρων σε πραγματικό χρόνο, τόσο in vitro όσο και in vivo. Η μητρική σειρά 4T1 προήλθε αρχικά από έναν αυθόρμητα αναπτυσσόμενο όγκο του μαστού σε ποντίκι BALB/c και χαρακτηρίζεται ως ένα εξαιρετικά ογκογόνο μοντέλο τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού. Όταν εγχύονται ορθοτοπικά στο μαστικό λιπώδες στρώμα συγγενών ποντικών BALB/c με ακεραιότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα κύτταρα 4T1 σχηματίζουν επιθετικούς πρωτογενείς όγκους που μεταστατίζουν αυθόρμητα στους πνεύμονες, το ήπαρ, τους λεμφαδένες και τα οστά, αναπαράγοντας πιστά την εξέλιξη του ανθρώπινου καρκίνου του μαστού στο στάδιο IV. Σημαντικά, το μοντέλο 4T1 έχει αποδειχθεί ότι παράγει οστεολυτικές οστικές μεταστάσεις μετά από ορθοτοπική εμφύτευση, καθιστώντας το ένα κλινικά σχετικό μοντέλο για τη μελέτη της διάδοσης του καρκίνου του μαστού και της αποικιοποίησης του σκελετού.

Η σήμανση των κυττάρων 4T1 με GFP επιτρέπει την ευαίσθητη ανίχνευση πρωτοπαθών όγκων, κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και μεταστατικών εστιών με τη χρήση φθορισμού μικροσκοπίας, κυτταρομετρίας ροής και συστημάτων απεικόνισης in vivo. Αυτό διευκολύνει την ποσοτική αξιολόγηση του μεταστατικού φορτίου, την ενδοζωική απεικόνιση της δυναμικής των καρκινικών κυττάρων και την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ όγκου-στρώματος ή όγκου-ανοσοκυττάρων. Σε ορθοτοπικά και ενδοκαρδιακά μοντέλα, τα παράγωγα 4T1 που εκφράζουν GFP επιτρέπουν την ακριβή ταυτοποίηση των καρκινικών κυττάρων εντός του μυελού των οστών, του πνευμονικού παρεγχύματος και άλλων μεταστατικών θέσεων, ξεπερνώντας τους περιορισμούς της ιστολογικής ανίχνευσης μόνης της. Επειδή η γονική σειρά 4T1 διατηρεί ανέπαφες ανοσογόνες αλληλεπιδράσεις σε συγγενείς ξενιστές BALB/c, το 4T1-GFP είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μελέτες που διερευνούν την ανοσοδιαμόρφωση, την αναδιαμόρφωση του μικροπεριβάλλοντος του όγκου και τον σχηματισμό μεταστατικών θύλακων υπό πλήρως ανοσοϊκανές συνθήκες.

Μοριακά, τα κύτταρα 4T1 εμφανίζουν χαρακτηριστικά επιθετικού, μεσεγχυματικού καρκινώματος του μαστού, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής διηθητικότητας, της αντοχής στην ανοϊκή και της ισχυρής μεταστατικής ικανότητας. Έχει αναφερθεί ότι παραλλαγές και υποκλώνοι του 4T1 εμφανίζουν διαφοροποιημένο μεταστατικό τροπισμό και προφίλ έκφρασης χημειοκινών, όπως ενισχυμένη παραγωγή CCL4 σε παράγωγα με οστικό τροπισμό, υπογραμμίζοντας τη χρησιμότητα του μοντέλου στην ανάλυση μηχανισμών μεταστάσεων ειδικών για κάθε όργανο. Ως φθορίζον αντίγραφο αυτού του καθιερωμένου μεταστατικού συστήματος, το 4T1-GFP παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα για ποσοτική έρευνα μεταστάσεων, δοκιμές θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, μελέτες ανοσο-ογκολογίας και ανάλυση της διάδοσης των καρκινικών κυττάρων και της κινητικής αποικισμού in vivo.

Organism

Ποντίκι

Tissue

Μαστικός αδένας

Disease

Κακοήθη νεοπλασμάτα

Metastatic site

Lung (primary metastatic site in orthotopic BALB/c model); also liver, lymph nodes, bone

Applications

Metastatic breast cancer research; GFP-based tumor cell tracking; orthotopic mammary fat pad implantation; in vivo imaging (fluorescence); immunotherapy evaluation; cancer immunology; metastasis biology

Κύτταρα 4T1-GFP | 305625

Synonyms	4T1-A, 4T1.0, 4T1/WT
-----------------	----------------------

Χαρακτηριστικά

Age	Απροσδιόριστη ηλικία
------------	----------------------

Gender	Γυναίκα
---------------	---------

Morphology	Epithelial-like
-------------------	-----------------

Cell type	Epithelial cells
------------------	------------------

Growth properties	Προσκολλημένο
--------------------------	---------------

Ρυθμιστικά δεδομένα

Citation	4T1-GFP (αριθμός καταλόγου Cytion 305625)
-----------------	---

Biosafety level	1
------------------------	---

NCBI_TaxID	10090
-------------------	-------

CellosaurusAccession	CVCL_0125
-----------------------------	-----------

GMO Status	GMO-S1: Αυτή η σειρά καρκινικών κυττάρων μαστού 4T1 περιέχει ένα γονιδιακό κατασκεύασμα έκφρασης GFP που μεταφέρεται μέσω ιογενούς φορέα, επιτρέποντας την παρακολούθηση των καρκινικών κυττάρων με φθορισμό. Αυτή η ταξινόμηση ισχύει μόνο στη Γερμανία και ενδέχεται να διαφέρει σε άλλες χώρες.
-------------------	--

Βιομοριακά δεδομένα

Surface antigens	GFP
-------------------------	-----

Χειρισμός

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2,1 mM σταθερή γλουταμίνη, w: 2,0 g/L NaHCO ₃ (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)
-----------------------	--

Supplements	Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS
--------------------	--------------------------------

Κύτταρα 4T1-GFP | 305625

Dissociation Reagent Accutase

Doubling time 12,6 ώρες

Split ratio 1 to 3

Seeding density 1 έως 3 x 10⁴ κύτταρα/cm²

Fluid renewal 2 έως 3 φορές την εβδομάδα

Freeze medium Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη.

Thawing and Culturing Cells

1. Επιβεβαιώστε ότι το φιαλίδιο παραμένει βαθιά παγωμένο κατά την παράδοση, καθώς τα κύτταρα αποστέλλονται σε ξηρό πάγο για να διατηρούνται οι βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά.
2. Κατά την παραλαβή, είτε αποθηκεύστε το κρυοφιαλίδιο αμέσως σε θερμοκρασίες κάτω των -150°C για να διασφαλίσετε τη διατήρηση της κυτταρικής ακεραιότητας, είτε προχωρήστε στο βήμα 3 εάν απαιτείται άμεση καλλιέργεια.
3. Για άμεση καλλιέργεια, αποψύξτε γρήγορα το φιαλίδιο βυθίζοντάς το σε υδατόλουτρο 37°C με καθαρό νερό και αντιμικροβιακό παράγοντα, αναδεύοντας απαλά για 40-60 δευτερόλεπτα μέχρι να παραμείνει ένα μικρό σβόλο πάγου.
4. Εκτελέστε όλα τα επόμενα βήματα υπό αποστειρωμένες συνθήκες σε απορροφητήρα ροής, απολυμαίνοντας το κρυοφιαλίδιο με 70% αιθανόλη πριν από το άνοιγμα.
5. Ανοίξτε προσεκτικά το απολυμασμένο φιαλίδιο και μεταφέρετε το εναιώρημα των κυττάρων σε ένα σωληνάριο φυγοκέντρησης των 15 ml που περιέχει 8 ml θρεπτικού μέσου καλλιέργειας σε θερμοκρασία δωματίου, αναμειγνύοντας απαλά.
6. Φυγοκεντρήστε το μείγμα στα 200 x g για 5 λεπτά, απορρίψτε προσεκτικά το υπερκείμενο που περιέχει το μέσο κατάψυξης.
7. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Ανάκτηση μετά την απόψυξη

Incubation Atmosphere 37°C, 5% CO₂, υγραποιημένη ατμόσφαιρα.

Κύτταρα 4T1-GFP | 305625

Shipping Conditions

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78°C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

Storage Conditions

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196°C . Η αποθήκευση στους -80°C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Ποιοτικός έλεγχος / Γενετικό προφίλ / HLA