

Κύτταρα UM-SCC-127 | 305725

Γενικές πληροφορίες

Description

Η UM-SCC-127 είναι μια ανθρώπινη κυτταρική σειρά HNSCC που προέρχεται από τη συλλογή UM-SCC του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Ως μέρος της σειράς UM-SCC με τους υψηλότερους αριθμούς, αποτελεί μία από τις πιο πρόσφατα δημιουργημένες σειρές αυτής της συλλογής. Η σειρά αναπτύσσεται προσκολλητικά με επιθηλιακή μορφολογία και αποτελεί μοντέλο για συγκριτικές μοριακές και φαρμακολογικές μελέτες του HNSCC.

Εφαρμόζεται στην έρευνα για το HNSCC, σε μελέτες ευαισθησίας σε φάρμακα, στην ανάλυση μοριακών οδών και σε πειράματα με το πάνελ πολλαπλών σειρών UM-SCC. Κατάλληλη για φαρμακολογικές αναλύσεις και μοντέλα ξενομοσχεύματος.

Organism

Ανθρώπινο

Tissue

Κεφάλι και λαιμός, στοματική κοιλότητα

Disease

Καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων κεφαλής και τραχήλου (HNSCC)

Applications

Έρευνα για τον καρκίνο του άνω ουρανίσκου και του φάρυγγα (HNSCC) · ευαισθησία στα φάρμακα · ανάλυση μοριακών οδών · μελέτες του πάνελ UM-SCC · μοντέλα ξενομοσχεύματος

Χαρακτηριστικά

Age

Απροσδιόριστη ηλικία

Gender

Φύλο απροσδιόριστο

Ethnicity

Εθνικότητα μη προσδιορισμένη

Morphology

Επιθηλιοειδής

Cell type

Επιθηλιακά κύτταρα

Growth properties

Προσκολλημένο

Ρυθμιστικά δεδομένα

Citation

UM-SCC-127 (αριθμός καταλόγου Cytion 305725)

Biosafety level

1

Κύτταρα UM-SCC-127 | 305725

NCBI_TaxID	9606
------------	------

Βιομοριακά δεδομένα

Χειρισμός

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2,0 mM σταθερής γλουταμίνης, w: 2,0 g/L NaHCO ₃ (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)
----------------	--

Supplements	Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS
-------------	--------------------------------

Dissociation Reagent	Accutase, 5 λεπτά, 37 °C
----------------------	--------------------------

Doubling time	περίπου 24 έως 48 ώρες
---------------	------------------------

Subculturing	Αφαιρέστε το μέσο, πλύνετε με PBS χωρίς ασβέστιο και μαγνήσιο, προσθέστε Accutase, επωάστε για 8–10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, αναδιαλύστε στο μέσο, φυγοκεντρήστε στα 300×g για 3 λεπτά, απορρίψτε τον υπερκείμενο, μεταφυτέψτε σε φρέσκο μέσο.
--------------	--

Split ratio	1 έως 5
-------------	---------

Seeding density	1 έως 3×10^4 κύτταρα/cm ²
-----------------	---

Fluid renewal	Κάθε 2 έως 3 ημέρες
---------------	---------------------

Freeze medium	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη.
---------------	--

Κύτταρα UM-SCC-127 | 305725**Thawing and
Culturing Cells**

1. Επιβεβαιώστε ότι το φιαλίδιο παραμένει βαθιά παγωμένο κατά την παράδοση, καθώς τα κύτταρα αποστέλλονται σε ξηρό πάγο για να διατηρούνται οι βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά.
2. Κατά την παραλαβή, είτε αποθηκεύστε το κρυοφιαλίδιο αμέσως σε θερμοκρασίες κάτω των -150°C για να διασφαλίσετε τη διατήρηση της κυτταρικής ακεραιότητας, είτε προχωρήστε στο βήμα 3 εάν απαιτείται άμεση καλλιέργεια.
3. Για άμεση καλλιέργεια, αποψύξτε γρήγορα το φιαλίδιο βυθίζοντάς το σε υδατόλουτρο 37°C με καθαρό νερό και αντιμικροβιακό παράγοντα, αναδεύοντας απαλά για 40-60 δευτερόλεπτα μέχρι να παραμείνει ένα μικρό σβόλο πάγου.
4. Εκτελέστε όλα τα επόμενα βήματα υπό αποστειρωμένες συνθήκες σε απορροφητήρα ροής, απολυμαίνοντας το κρυοφιαλίδιο με 70% αιθανόλη πριν από το άνοιγμα.
5. Ανοίξτε προσεκτικά το απολυμασμένο φιαλίδιο και μεταφέρετε το εναίωρημα των κυττάρων σε ένα σωληνάριο φυγοκέντρησης των 15 ml που περιέχει 8 ml θρεπτικού μέσου καλλιέργειας σε θερμοκρασία δωματίου, αναμειγνύοντας απαλά.
6. Φυγοκεντρήστε το μείγμα στα $200 \times g$ για 5 λεπτά, απορρίψτε προσεκτικά το υπερκείμενο που περιέχει το μέσο κατάψυξης.
7. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Ανάκτηση μετά την απόψυξη

**Incubation
Atmosphere**

37°C , 5% CO_2 , υγραποιημένη ατμόσφαιρα.

**Shipping
Conditions**

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78°C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

**Storage
Conditions**

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196°C . Η αποθήκευση στους -80°C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Έλεγχος ποιότητας και μοριακή ανάλυση