

Κύτταρα Ramos | 302007

Γενικές πληροφορίες

Description

Η κυτταρική σειρά Ramos, η οποία δημιουργήθηκε από το ασκίτικό υγρό ενός 3χρονου αγοριού με λέμφωμα Burkitt, αποτελεί σημαντικό πόρο στην έρευνα της ανοσολογίας. Αυτή η κυτταρική σειρά, που χαρακτηρίζεται από την έκκριση IgM, είναι ανεκτίμητη για την ανάλυση των αντιγόνων επιφάνειας των B κυττάρων, τη δοκιμή κυτταροτοξικών φαρμάκων, την ανάλυση μεταλλάξεων και τη διερεύνηση των αποπτωτικών μηχανισμών.

Τα κύτταρα RAMOS παρουσιάζουν μορφολογία που μοιάζει με λεμφοβλάστη και είναι γνωστά για την ισχυρή ανάπτυξή τους in vitro. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμα σε μελέτες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την κακοήθεια των B-κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης των μονοπατιών σηματοδότησης του υποδοχέα B-κυττάρων (BCR), της γονιδιακής έκφρασης και των μηχανισμών που διέπουν τη μετατροπή των φυσιολογικών B-κυττάρων σε κακοήθη κύτταρα.

Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης συχνά σε μελέτες παραγωγής αντισωμάτων λόγω της B-κυτταρικής τους καταγωγής, επιτρέποντας στους ερευνητές να διερευνήσουν τις αποκρίσεις των B-κυττάρων σε διάφορα αντιγόνα και την επακόλουθη παραγωγή αντισωμάτων. Τα κύτταρα RAMOS χρησιμοποιούνται περαιτέρω σε μελέτες ανακάλυψης φαρμάκων και τοξικότητας. Η ευαισθησία τους σε διάφορους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες τα καθιστά ανεκτίμητο εργαλείο στην προκλινική αξιολόγηση νέων καρκινικών θεραπειών.

Ειδικότερα, η κυτταρική σειρά Ramos είναι αρνητική στον EBV, παρέχοντας ένα βασικό μοντέλο για τη μελέτη του λεμφώματος Burkitt χωρίς την επίδραση του ιού Epstein-Barr.

Συνοπτικά, η κυτταρική σειρά Ramos αποτελεί ανεκτίμητο πλεονέκτημα για τη μελέτη της βιολογίας των B-κυττάρων και του λεμφώματος Burkitt και συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση της ανάπτυξης των B-κυττάρων, της κακοήθειας, της παραγωγής αντισωμάτων και της αποτελεσματικότητας των νέων καρκινικών θεραπειών.

Organism

Ανθρώπινο

Tissue

Αιμοποιητικό

Disease

Λέμφωμα Burkitt

Applications

Ανάλυση των αντιγόνων επιφάνειας των B κυττάρων, δοκιμή κυτταροτοξικών φαρμάκων, ανάλυση μεταλλάξεων, ανάλυση αποπτωτικών μηχανισμών, τυποποίηση HLA

Synonyms

RAMOS, Ramos 1, RA 1, RA.1, Ra #1, Ra No. 1, Ramos(RA1), Ramos-RA1, Ramos (RA 1), Ramos (RA), Ramos (RA)

Χαρακτηριστικά

Age

3 χρόνια

Gender

Άντρας

Ethnicity

Καυκάσιος

Κύτταρα Ramos | 302007

Morphology Στρογγυλά κύτταρα

Cell type Β λεμφοβλάστη

Growth properties Αναστολή

Ρυθμιστικά δεδομένα

Citation Ramos (αριθμός καταλόγου Cytion 302007)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_0597

Βιομοριακά δεδομένα

Antigen expression CD10+, CD19+

Karyotype 46, υποδιπλοειδής

Χειρισμός

Culture Medium RPMI 1640, w: 2,0 mM σταθερής γλουταμίνης, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)

Supplements Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS

Subculturing Διατηρήστε τις καλλιέργειες προσθέτοντας ή αντικαθιστώντας περιοδικά το μέσο. Ξεκινήστε τις καλλιέργειες με πυκνότητα 5×10^5 κύτταρα/ml και διατηρήστε τη συγκέντρωση των κυττάρων εντός του εύρους 3×10^5 έως 1×10^6 κύτταρα/ml για βέλτιστη ανάπτυξη.

Seeding density 3×10^5 κύτταρα/ml

Fluid renewal 2 φορές την εβδομάδα

Κύτταρα Ramos | 302007**Freeze medium**

Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Thawing and Culturing Cells

1. Επιβεβαιώστε ότι το φιαλίδιο παραμένει βαθιά παγωμένο κατά την παράδοση, καθώς τα κύτταρα αποστέλλονται σε ξηρό πάγο για να διατηρούνται οι βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά.
2. Κατά την παραλαβή, είτε αποθηκεύστε το κρυοφιαλίδιο αμέσως σε θερμοκρασίες κάτω των -150°C για να διασφαλίσετε τη διατήρηση της κυτταρικής ακεραιότητας, είτε προχωρήστε στο βήμα 3 εάν απαιτείται άμεση καλλιέργεια.
3. Για άμεση καλλιέργεια, αποψύξτε γρήγορα το φιαλίδιο βυθίζοντάς το σε υδατόλουτρο 37°C με καθαρό νερό και αντιμικροβιακό παράγοντα, αναδεύοντας απαλά για 40-60 δευτερόλεπτα μέχρι να παραμείνει ένα μικρό σβόλο πάγου.
4. Εκτελέστε όλα τα επόμενα βήματα υπό αποστειρωμένες συνθήκες σε απορροφητήρα ροής, απολυμαίνοντας το κρυοφιαλίδιο με 70% αιθανόλη πριν από το άνοιγμα.
5. Ανοίξτε προσεκτικά το απολυμασμένο φιαλίδιο και μεταφέρετε το εναιώρημα των κυττάρων σε ένα σωληνάριο φυγοκέντρησης των 15 ml που περιέχει 8 ml θρεπτικού μέσου καλλιέργειας σε θερμοκρασία δωματίου, αναμειγνύοντας απαλά.
6. Φυγοκεντρίστε το μείγμα στα $300 \times g$ για 3 λεπτά για να διαχωριστούν τα κύτταρα και απορρίψτε προσεκτικά το υπερκείμενο που περιέχει το υπόλοιπο μέσο κατάψυξης.
7. Επανασυσσωματώστε απαλά το κυτταρικό σφαιρίδιο σε 10 ml φρέσκου μέσου καλλιέργειας. Για προσκολλημένα κύτταρα, μοιράστε το εναιώρημα σε δύο φιάλες καλλιέργειας T25- για καλλιέργειες εναιωρήματος, μεταφέρετε όλο το μέσο σε μία φιάλη T25 για να προωθήσετε την αποτελεσματική αλληλεπίδραση και ανάπτυξη των κυττάρων.
8. Τηρείτε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα υποκαλλιέργειας για τη συνεχή ανάπτυξη και διατήρηση της κυτταρικής σειράς, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα πειραματικά αποτελέσματα.

Incubation Atmosphere

37°C , 5% CO_2 , υγραποιημένη ατμόσφαιρα.

Flask Coating

Κανένα

Κύτταρα Ramos | 302007**Freezing Procedure**

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

Shipping Conditions

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

Storage Conditions

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Ποιοτικός έλεγχος / Γενετικό προφίλ / HLA**Sterility**

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.

Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Προφίλ STR

CSF1PO: 10,11
D13S317: 12, 13, 14
D16S539: 10,13
D5S818: 7,12
D7S820: 11
TH01: 7,9,3
TPOX: 8,9
vWA: 15,16
D3S1358: 14,15
D21S11: 30
D18S51: 14,15
Penta E: 6,21
Penta D: 10,13
D8S1179: 13
FGA: 20,24
D2S1338: 20,23

Κύτταρα Ramos | 302007

**HLA
αλληλόμορφα**

A*	'03:01:01
B*	'44:160Q, '01.02.1900 03:01
C*	'16:01:01
DRB1*	'07:01:01
DQA1*	'02:01:01
DQB1*	'02:02:01
DPB1*	'04:01:01, '104:01:01
E	'01:03:02