

Células CHO-IL2RA | 305980

Información general

Description

Aviso legal: Los precios indicados para las líneas celulares son exclusivos para clientes del ámbito académico o sin ánimo de lucro. Para las entidades comerciales, el precio es de aproximadamente 6.250 €. Si representa a una entidad comercial o no está seguro de a qué categoría pertenece, póngase [en contacto con nosotros](#).

Las células CHO-IL2RA son células recombinantes de ovario de hámster chino (CHO) modificadas genéticamente para expresar de forma estable el receptor alfa de la interleucina-2 humana (IL-2R α ; CD25/IL2RA), una subunidad del receptor de citocinas de alta afinidad implicada en la regulación de la activación de las células T y la homeostasis inmunitaria. El CD25 forma parte del complejo receptor heterotrimérico de la IL-2 junto con el IL-2R β (CD122) y la cadena gamma común (CD132), lo que permite la unión de alta afinidad de la interleucina-2 y la activación de las vías de señalización JAK/STAT posteriores. Fisiológicamente, el CD25 se expresa en grandes cantidades en los linfocitos T activados y en las células T reguladoras (Treg), y también se ha descrito una expresión anómala en varias neoplasias hematológicas y trastornos inflamatorios.

Las células CHO-IL2RA se utilizan ampliamente en inmunología y en los flujos de trabajo de desarrollo terapéutico para la caracterización de anticuerpos monoclonales anti-CD25, terapias basadas en citocinas, anticuerpos biespecíficos y estrategias de orientación de células inmunitarias modificadas genéticamente. El sistema de expresión recombinante estable permite la evaluación cuantitativa de la unión del ligando, la ocupación del receptor, la afinidad del anticuerpo y la internalización del receptor. Estas células también son valiosas para el desarrollo de ensayos de citometría de flujo, pruebas de potencia, ensayos de unión basados en células y aplicaciones de cribado de alto rendimiento que impliquen la modulación de la vía de la IL-2. Además, los modelos CHO-IL2RA pueden servir de apoyo a estudios que examinen la orientación selectiva de las células T activadas o los mecanismos asociados a las células T reguladoras en la autoinmunidad, los trasplantes y la inmunoterapia contra el cáncer.

Organism

Hámster chino

Tissue

Ovario

Disease

Ovario de hámster chino, no neoplásico; modificado genéticamente para la expresión de IL2RA (CD25) en la superficie

Applications

Cribado de anticuerpos; desarrollo de terapias dirigidas contra el IL2RA; investigación sobre la biología de las células T; investigación sobre enfermedades autoinmunes; citometría de flujo

Características

Age

Adultos

Gender

Mujer

Células CHO-IL2RA | 305980**Morphology** De tipo epitelial**Cell type** Células epiteliales**Growth properties** Adherente/suspensión**Datos reglamentarios****Citation** CHO-IL2RA (número de catálogo de Cytion 305980)**Biosafety level** 1**NCBI_TaxID** 10029**CellosaurusAccession** CVCL_A8W8**GMO Status** GMO-S1: Esta línea celular CHO contiene un casete de expresión de IL2RA que permite realizar análisis de la función del receptor. Esta clasificación solo es válida en Alemania y puede diferir en otros países.**Datos biomoleculares****Surface antigens** IL2RA (CD25)**Manejo de****Culture Medium**
Para cultivos adherentes: DMEM:F12 de Ham (1:1), w: 3,1 g/L de glucosa, w: 2,5 mM de L-glutamina, w: 15 mM de HEPES, w: 0,5 mM de piruvato sódico, w: 1,2 g/L de NaHCO₃ (número de artículo de Cytion 820400a)
Para cultivos en suspensión: CHO Growth Medium A (de InSCREENeX; número de catálogo de InSCREENeX INS-ME-1039)**Supplements** Para cultivos adherentes: Suplementar el medio con un 5% de FBS. Añadir Geneticina (G418-Sulfat) hasta alcanzar una concentración final de 0,5 mg/mL.**Dissociation Reagent** Para cultivos adherentes: Tripsina-EDTA**Doubling time** aprox. 14-16 horas

Células CHO-IL2RA | 305980

Subculturing Para el cultivo rutinario de células adherentes: Aspirar el medio de cultivo antiguo de las células adherentes y lavarlas con PBS para eliminar cualquier resto de medio. Después de aspirar el PBS, añadir el volumen apropiado de solución de tripsina/EDTA en función del tamaño del recipiente de cultivo (por ejemplo, 1 ml para un matraz T25, 3 ml para un matraz T75) e incubar a temperatura ambiente o 37°C durante 5-10 minutos, o hasta que las células se desprendan. Controlar el desprendimiento al microscopio y, si es necesario, golpear suavemente el recipiente para liberar las células. Una vez desprendidas, añadir medio completo para inactivar la tripsina/EDTA, resuspender suavemente las células y transferir una alícuota de la suspensión celular a un nuevo recipiente de cultivo que contenga medio fresco. Colocar el recipiente en una incubadora a 37°C con un 5% de CO_2 y cambiar el medio cada 2-3 días.

Split ratio Del 1 al 5

Seeding density De 2 a 5×10^4 células/cm²

Fluid renewal de 2 a 3 veces por semana

Post-Thaw Recovery Tras la descongelación, dividir las células en una proporción de 1:2 a 1:3 en matraces T25 y dejar que las células se recuperen del proceso de congelación y se adhieran (para cultivos adherentes) durante al menos 24 horas.

Freeze medium Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.

Células CHO-IL2RA | 305980

Thawing and Culturing Cells

1. Confirme que el vial permanece profundamente congelado en el momento de la entrega, ya que las células se envían en hielo seco para mantener temperaturas óptimas durante el transporte.
2. Tras la recepción, almacene el criovial inmediatamente a temperaturas inferiores a -150°C para garantizar la conservación de la integridad celular, o proceda al paso 3 si se requiere el cultivo inmediato.
3. Para el cultivo inmediato, descongele rápidamente el vial sumergiéndolo en un baño de agua a 37°C con agua limpia y un agente antimicrobiano, agitando suavemente durante 40-60 segundos hasta que quede un pequeño grumo de hielo.
4. Realice todos los pasos siguientes en condiciones estériles en una campana de flujo, desinfectando el criovial con etanol al 70% antes de abrirlo.
5. Abrir con cuidado el vial desinfectado y transferir la suspensión celular a un tubo de centrifuga de 15 ml que contenga 8 ml de medio de cultivo a temperatura ambiente, mezclando suavemente.
6. Centrifugar la mezcla a $300 \times g$ durante 3 minutos para separar las células y desechar cuidadosamente el sobrenadante que contiene medio de congelación residual.
7. Resuspender suavemente el sedimento celular en 10 ml de medio de cultivo fresco. Para las células adherentes, dividir la suspensión entre dos matraces de cultivo T25; para los cultivos en suspensión, transferir todo el medio a un matraz T25 para promover la interacción y el crecimiento celular efectivos.
8. Siga los protocolos de subcultivo establecidos para el crecimiento y mantenimiento continuos de la línea celular, garantizando resultados experimentales fiables.

Shipping Conditions

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78°C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

Storage Conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196°C . El almacenamiento a -80°C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

Control de calidad / Perfil genético / HLA

Células CHO-IL2RA | 305980

Sterility

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.

Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.