

## Células FaDu | 305033

## Información general

## Description

FaDu es una línea celular humana derivada de un carcinoma de células escamosas de la hipofaringe. Establecidas a partir de un tumor de un paciente adulto, las células FaDu se utilizan con frecuencia en la investigación médica centrada en la biología del cáncer, especialmente en estudios relacionados con los cánceres de cabeza y cuello. Estas células presentan una morfología epitelial y son adherentes en condiciones de cultivo. Las FaDu son conocidas por su crecimiento robusto y suelen emplearse en ensayos para comprender la proliferación de células cancerosas, la respuesta a agentes terapéuticos y la expresión de genes relacionados con la progresión del cáncer y la metástasis.

En la investigación científica, las células FaDu han sido fundamentales para examinar la eficacia de los tratamientos de radioterapia y quimioterapia, proporcionando información sobre las respuestas celulares al daño del ADN y los mecanismos de reparación. La línea celular también se ha utilizado en estudios que exploran vías moleculares implicadas en el cáncer, como la vía de señalización del EGFR, que suele estar alterada en los cánceres de cabeza y cuello. La versatilidad y relevancia de las células FaDu las convierten en un valioso modelo para la investigación oncológica, contribuyendo al desarrollo de terapias dirigidas y a la comprensión de la biología celular del cáncer a nivel molecular.

**Organism** Humano

**Tissue** Faringe

**Disease** Carcinoma hipofaríngeo de células escamosas

**Synonyms** FaDU, FADU

## Características

**Age** 56 años

**Gender** Hombre

**Ethnicity** Asiático

**Morphology** Epitelial

**Growth properties** Adherente

## Datos reglamentarios

**Citation** FaDu (número de catálogo de Cytion 305033)

**Células FaDu | 305033****Biosafety level** 1**NCBI\_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL\_1218**Datos biomoleculares****Tumorigenic** Sí**Manejo de****Culture Medium** EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamina, w: 2,2 g/L NaHCO<sub>3</sub>, w: EBSS (número de artículo de Cytion 820100a)**Supplements** Suplementar el medio con un 10% de FBS y un 1% de NEAA**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco.**Split ratio** 1:2 a 1:4**Fluid renewal** de 2 a 3 veces por semana**Freeze medium** Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.

## Células FaDu | 305033

### Thawing and Culturing Cells

1. Confirme que el vial permanece profundamente congelado en el momento de la entrega, ya que las células se envían en hielo seco para mantener temperaturas óptimas durante el transporte.
2. Tras la recepción, almacene el criovial inmediatamente a temperaturas inferiores a  $-150^{\circ}\text{C}$  para garantizar la conservación de la integridad celular, o proceda al paso 3 si se requiere el cultivo inmediato.
3. Para el cultivo inmediato, descongele rápidamente el vial sumergiéndolo en un baño de agua a  $37^{\circ}\text{C}$  con agua limpia y un agente antimicrobiano, agitando suavemente durante 40-60 segundos hasta que quede un pequeño grumo de hielo.
4. Realice todos los pasos siguientes en condiciones estériles en una campana de flujo, desinfectando el criovial con etanol al 70% antes de abrirlo.
5. Abrir con cuidado el vial desinfectado y transferir la suspensión celular a un tubo de centrifuga de 15 ml que contenga 8 ml de medio de cultivo a temperatura ambiente, mezclando suavemente.
6. Centrifugar la mezcla a  $300 \times g$  durante 3 minutos para separar las células y desechar cuidadosamente el sobrenadante que contiene medio de congelación residual.
7. Resuspender suavemente el sedimento celular en 10 ml de medio de cultivo fresco. Para las células adherentes, dividir la suspensión entre dos matraces de cultivo T25; para los cultivos en suspensión, transferir todo el medio a un matraz T25 para promover la interacción y el crecimiento celular efectivos.
8. Siga los protocolos de subcultivo establecidos para el crecimiento y mantenimiento continuos de la línea celular, garantizando resultados experimentales fiables.

### Incubation Atmosphere

$37^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , atmósfera humidificada.

### Flask Coating

Ninguno

### Freezing Procedure

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente  $-78^{\circ}\text{C}$  durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

### Shipping Conditions

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente  $-78^{\circ}\text{C}$  durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

## Células FaDu | 305033

### Storage Conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

## Control de calidad / Perfil genético / HLA

### Sterility

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.

Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

### Perfil de STR

**CSF1PO:** 12  
**D13S317:** 8,9  
**D16S539:** 11  
**D5S818:** 12  
**D7S820:** 11,12  
**TH01:** 8  
**TPOX:** 11  
**vWA:** 15,17  
**D3S1358:** 17,18  
**D21S11:** 31.2  
**D18S51:** 16  
**Penta E:** 17,19  
**Penta D:** 11  
**D8S1179:** 13  
**FGA:** 25  
**D1S1656:** 16,16.3  
**D6S1043:** 11,12  
**D2S1338:** 19  
**D12S391:** 17,21  
**D19S433:** 14,16