

**Células MKN-45 | 300489****Información general****Description**

La línea celular MKN-45 es una línea celular humana de cáncer gástrico, derivada del adenocarcinoma poco diferenciado del estómago. Estas células presentan características típicas del cáncer gástrico, como un crecimiento rápido y un alto grado de inestabilidad genética. Las células MKN-45 se utilizan habitualmente en la investigación del cáncer para estudiar la biología tumoral, los mecanismos de resistencia a los fármacos y las vías moleculares implicadas en la progresión del cáncer gástrico. Su capacidad para formar tumores cuando se xenoinjertan en ratones inmunodeprimidos las convierte en un valioso modelo para estudios in vivo.

Las células MKN-45 son de naturaleza epitelial y crecen como células adherentes en cultivo. Expresan varios biomarcadores relevantes para el cáncer gástrico, como el antígeno carcinoembrionario (CEA) y la cadherina E, lo que las hace útiles para la investigación diagnóstica y terapéutica. Además, las células MKN-45 se utilizan a menudo en la evaluación de fármacos quimioterapéuticos y terapias dirigidas debido a su capacidad de respuesta al tratamiento y su capacidad para imitar el comportamiento clínico de los tumores gástricos humanos. Los investigadores también utilizan esta línea celular para explorar los efectos de las modificaciones genéticas y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas destinadas a mejorar los resultados de los pacientes con cáncer gástrico.

**Organism** Humano**Tissue** Estómago**Disease** Adenocarcinoma gástrico**Metastatic site** Hígado**Synonyms** MKN 45, MKN45**Características****Age** 62 años**Gender** Mujer**Ethnicity** Japonés**Growth properties** Adherente/suspensión**Datos reglamentarios****Citation** MKN-45 (número de catálogo 300489 de Cytion)

**Células MKN-45 | 300489**

<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	9606
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_0434

**Datos biomoleculares****Manejo de**

<b>Culture Medium</b>	RPMI 1640, con: 2,0 mM de glutamina estable, con: 2,0 g/L de NaHCO <sub>3</sub> (número de artículo de Cytion 820700a)
-----------------------	--

<b>Supplements</b>	Complementar el medio con un 20% de FBS inactivado por calor
--------------------	--

<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
-----------------------------	----------

<b>Subculturing</b>	Reunir las células en suspensión en un tubo de 15 ml y lavar suavemente las células adherentes con PBS sin calcio ni magnesio (utilizar 3-5 ml para matraces T25 y 5-10 ml para matraces T75). Aplicar Accutase (1-2 ml para matraces T25, 2,5 ml para matraces T75) asegurando la cobertura completa de la capa celular. Dejar incubar las células a temperatura ambiente durante 10 minutos. Tras la incubación, combinar y centrifugar tanto la suspensión como las células adherentes. Tras la centrifugación, resuspender cuidadosamente el sedimento celular y transferir la suspensión celular a nuevos matraces que contengan medio fresco.
---------------------	---

<b>Freeze medium</b>	Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.
----------------------	---

## Células MKN-45 | 300489

### Thawing and Culturing Cells

1. Confirme que el vial permanece profundamente congelado en el momento de la entrega, ya que las células se envían en hielo seco para mantener temperaturas óptimas durante el transporte.
2. Tras la recepción, almacene el criovial inmediatamente a temperaturas inferiores a  $-150^{\circ}\text{C}$  para garantizar la conservación de la integridad celular, o proceda al paso 3 si se requiere el cultivo inmediato.
3. Para el cultivo inmediato, descongele rápidamente el vial sumergiéndolo en un baño de agua a  $37^{\circ}\text{C}$  con agua limpia y un agente antimicrobiano, agitando suavemente durante 40-60 segundos hasta que quede un pequeño grumo de hielo.
4. Realice todos los pasos siguientes en condiciones estériles en una campana de flujo, desinfectando el criovial con etanol al 70% antes de abrirlo.
5. Abrir con cuidado el vial desinfectado y transferir la suspensión celular a un tubo de centrifuga de 15 ml que contenga 8 ml de medio de cultivo a temperatura ambiente, mezclando suavemente.
6. Centrifugar la mezcla a  $300 \times g$  durante 3 minutos para separar las células y desechar cuidadosamente el sobrenadante que contiene medio de congelación residual.
7. Resuspender suavemente el sedimento celular en 10 ml de medio de cultivo fresco. Para las células adherentes, dividir la suspensión entre dos matraces de cultivo T25; para los cultivos en suspensión, transferir todo el medio a un matraz T25 para promover la interacción y el crecimiento celular efectivos.
8. Siga los protocolos de subcultivo establecidos para el crecimiento y mantenimiento continuos de la línea celular, garantizando resultados experimentales fiables.

### Incubation Atmosphere

$37^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , atmósfera humidificada.

### Flask Coating

Ninguno

### Freezing Procedure

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente  $-78^{\circ}\text{C}$  durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

### Shipping Conditions

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente  $-78^{\circ}\text{C}$  durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

## Células MKN-45 | 300489

### Storage Conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

## Control de calidad / Perfil genético / HLA

### Sterility

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.

Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

### Perfil de STR

**Amelogenin:** x,x  
**CSF1PO:** 12  
**D13S317:** 8,11  
**D16S539:** 10  
**D5S818:** 10,11  
**D7S820:** 10,11  
**TH01:** 7  
**TPOX:** 8  
**vWA:** 19  
**D3S1358:** 15,16  
**D21S11:** 31  
**D18S51:** 16  
**Penta E:** 10  
**Penta D:** 10  
**D8S1179:** 13,17  
**FGA:** 19,24  
**D6S1043:** 14  
**D2S1338:** 18  
**D12S391:** 26  
**D19S433:** 14,16.2