

## HT-1376 rakud | 305100

## Üldine teave

## Description

HT-1376 rakuliin on saadud inimese põiekartsinoomist, täpsemalt 3. astme üleminekurakkude kartsinoomist. See rakuliin loodi kasvajas, mis saadi transuretraalse reseksiooni teel täiskasvanud naispatsiendilt, kellel oli varem invasiivne põiekartsinoom. HT-1376 rakkudel on epiteeliomadused, sealhulgas mikrovillide ja toonofibrillide olemasolu, mis viitab nende epiteeli päritolule. Lisaks on neil rakkudel mitu markerkromosoomi, mis eristavad neid teistest teadaolevatest kasvajarakkude liinidest. HT-1376 rakud kasvavad teadaolevalt ka pehmel agaril ja on väga tumorigeensed, moodustades immuunpuudega hiirtele ja hamstritele süstimisel kasvaja.

HT-1376 on oluline põievähi uurimisel selle geneetilise profiili tõttu, mis hõlmab märkimisväärseid muutusi kromosoomi 9p21 piirkonnas. Selles piirkonnas esineb sageli suuri homosügootseid deletsioone, mis viivad kriitiliste kasvajasupressorgeenide, nagu CDKN2, CDKN2B ja MTAP, inaktiveerumiseni. Need deletsioonid on põievähi puhul tavalised ja on olulised kasvajate tekke aluseks olevate molekulaarsete mehhanismide mõistmiseks. Näiteks CDKN2 ja CDKN2B kadumine on seotud rakutsükli düsregulatsiooniga, mis on vähi progresseerumise võtmesündmus. Lisaks on HT-1376 rakkudes uuritud CDKN2 geeni toote p16 valgu ekspressiooni, mis on sageli korrelatsioonis teise kasvajasupressorvalgu pRb ekspressiooni puudumisega.

HT-1376 rakuliini on kasutatud ka viroloogiauringutes, et hinnata kasvajaviiruste olemasolu, kuigi nendes rakkudes ei ole tuvastatud viiruse ekspressiooni. See muudab HT-1376 väärtuslikuks mudeliks põievähi arengu ja progresseerumise mitte-viiruslike mehhanismide uurimiseks. Rakuliini geneetilised muutused ja selle võime kasvada in vitro ja in vivo annavad tugeva platvormi prekliinilisteks uuringuteks, sealhulgas ravimite testimiseks ja uute ravistrateegiate uurimiseks, mis on suunatud põievähi konkreetsetele geneetilistele radadele.

## Organism

Inimene

## Tissue

Uriinipõie

## Disease

Põie kartsinoom

## Synonyms

HT1376, HT 1376, HT 1376.T

## Omadused

## Age

58 aastat

## Gender

Naised

## Ethnicity

Euroopa

## Morphology

Epiteel

## Growth properties

Kinnipeetav

## HT-1376 rakud | 305100

## Regulatiivsed andmed

<b>Citation</b>	HT-1376 (Cytioni katalooginumber 305100)
<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	9606
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_1292

## Biomolekulaarsed andmed

<b>Protein expression</b>	Fibrinolüütiline aktiivsus, interferoon
<b>Tumorigenic</b>	Jah

## Töötlemine

<b>Culture Medium</b>	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamiin, w: 2,2 g/L NaHCO <sub>3</sub> , w: EBSS (Cytioni artikli number 820100a)
<b>Supplements</b>	Täiendada söötme 10% FBS ja 1% NEAAga
<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
<b>Doubling time</b>	31 tundi
<b>Subculturing</b>	Eemaldage kleepunud rakkudelt vana söötme ja peske neid PBS-ga, milles puudub kaltsium ja magneesium. T25 kolbide puhul kasutage 3-5 ml PBS-i ja T75 kolbide puhul 5-10 ml. Seejärel katke rakud täielikult Accutase'iga, kasutades 1-2 ml T25 kolbide puhul ja 2,5 ml T75 kolbide puhul. Laske rakkudel inkubeerida 8-10 minutit toatemperatuuril, et need eralduksid. Pärast inkubeerimist segage rakud ettevaatlikult 10 ml söötmega, et neid resuspenseerida, seejärel tsentrifugeerige 3 minutit 300xg juures. Visake supernatant ära, suspenseerige rakud uuesti värskes keskkonnas ja viige need uutesse kolvidesse, mis sisaldavad juba värsket keskkonda.
<b>Fluid renewal</b>	2 kuni 3 korda nädalas
<b>Freeze medium</b>	Krüsäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni katalooginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

## HT-1376 rakud | 305100

### Thawing and Culturing Cells

1. Veenduge, et vial jääb tarnimisel sügavkülmutatud, sest rakud transporditakse kuiva jääga, et säilitada optimaalne temperatuur transpordi ajal.
2. Pärast kättesaamist säilitage krüoviaal kas kohe temperatuuril alla  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ , et tagada rakkude terviklikkuse säilimine, või jätkake sammuga 3, kui on vaja koheselt kultiveerida.
3. Kohese kultiveerimise korral sulatage viali kiiresti, kastes selle  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$  veevanni puhta vee ja antimikroobse ainega, segades seda õrnalt 40-60 sekundit, kuni alles jääb väike jääklomp.
4. Tehke kõik järgmised toimingud steriilsetes tingimustes vooluhoodis, desinfitseerides krüoviaal enne avamist 70% etanooliga.
5. Avage desinfitseeritud viali ettevaatlikult ja viige raku suspensioon ettevaatlikult segades 15 ml tsentrifuugitorusse, mis sisaldab 8 ml toatemperatuuril olevat kasvukeskkonda.
6. Rakkude eraldamiseks tsentrifuugige segu  $300 \times g$  juures 3 minutit ja visake ülejäänud külmutusvedelikku sisaldav supernatant ettevaatlikult ära.
7. Resuspendeerige rakupellet ettevaatlikult 10 ml värskes kasvukeskkonnas. Adhereerivate rakkude puhul jagage suspensioon kahe T25 kultuurkolvi vahel; suspensioonikultuuride puhul kandke kogu söötme keskkond ühte T25 kolbi, et soodustada rakkude tõhusat koostoimet ja kasvu.
8. Järgige kehtestatud subkultuuriprotokolle rakuliini jätkuvaks kasvuks ja säilitamiseks, tagades usaldusväärsed katsetulemused.

### Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , niisutatud atmosfäär.

### Flask Coating

Optimaalse kinnitumise ja elujõulisuse tagamiseks pärast sulatamist soovitame kasutada **kollageeniga kaetud koldeid või plaate**.

### Freezing Procedure

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige vialid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

### Shipping Conditions

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige vialid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

## HT-1376 rakud | 305100

### Storage Conditions

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

## Kvaliteedikontroll / Geneetiline profiil / HLA

### Sterility

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminesentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.

Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.