

MA-Balb rakud | 400270

Üldine teave

Description

Ma-Balb on hiire rakuliin, mis on loodud in vitro emase BALB/c hiire spontaansest rinnanäärme kartsinoomist. See rakuliin on saadud noore BALB/c-hiire rinnanäärme piirkonnast saadud soliidse, oa-suuruse kasvajast. Ma-Balb rakud on olulised vähiuuringutes, eriti rinnanäärme kasvajate uurimisel, kuna nad on pärit sellise vähi tekkimise poolest tuntud kasvajatest.

Ma-Balb rakuliin, mille morfoloogia sarnaneb fibroblastidele, on usaldusväärne mudel rinnanäärme kartsinoomi põhjustavate rakuliste ja molekulaarsete mehhanismide uurimiseks. Teadlased kasutavad neid rakke, et uurida geneetilisi ja keskkonnategureid, mis aitavad kaasa kasvajate tekkimisele, võimaldades sügavamalt arusaamist vähi bioloogiast. Lisaks on Ma-Balb rakud olulised uute vähivastaste ravimeetodite katsetamisel, andes ülevaate ravimite tõhususest ja toksilisusest. Nende tähtsus laieneb ka immunoloogilistele uuringutele, kus nad aitavad selgitada vähirakkude ja immuunsüsteemi vahelisi vastastikmõjusid, aidates seeläbi kaasa immunoteraapiate arendamisele.

Organism Hiir

Tissue Rind

Disease Hiire rinnanäärme pahaloomulised kasvajad

Synonyms Ma-Balb

Omadused

Breed/Subspecies BALB/c

Age 1 aasta

Gender Naised

Morphology Epiteelilaadsed

Cell type Fibroblastide

Growth properties Kinnipeetav

Regulatiivsed andmed

Citation MA-Balb (Cytioni katalooginumber 400270)

MA-Balb rakud | 400270

Biosafety level 1**NCBI_TaxID** 10090**CellosaurusAccession** CVCL_5795**Biomolekulaarsed andmed****Tumorigenic** Jah, Balb/c hiirtel**Viruses** MAP-test negatiivne.**Töötlemine****Culture Medium** DMEM, w: 4,5 g/L glükoosi, w: 4 mM L-glutamiini, w: 3,7 g/L NaHCO₃, w: 1,0 mM naatriumpüruvaati (Cytioni artikli number 820300a)**Supplements** Täiendada söötme 10% FBS-ga**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Eemaldage kleepunud rakkudelt vana söötme ja peske neid PBS-ga, milles puudub kaltsium ja magneesium. T25 kolbide puhul kasutage 3-5 ml PBS-i ja T75 kolbide puhul 5-10 ml. Seejärel katke rakud täielikult Accutase'iga, kasutades 1-2 ml T25 kolbide puhul ja 2,5 ml T75 kolbide puhul. Laske rakkudel inkubeerida 8-10 minutit toatemperatuuril, et need eralduksid. Pärast inkubeerimist segage rakud ettevaatlikult 10 ml söötmega, et neid resuspenseerida, seejärel tsentrifugeerige 3 minutit 300xg juures. Visake supernatant ära, suspenseerige rakud uuesti värskes keskkonnas ja viige need uutesse kolvidesse, mis sisaldavad juba värsket keskkonda.**Fluid renewal** 2 kuni 3 korda nädalas**Post-Thaw Recovery** 24 kuni 48 tundi**Freeze medium** Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni katalooginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

MA-Balb rakud | 400270

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Veenduge, et vial jääb tarnimisel sügavkülmutatud, sest rakud transporditakse kuiva jääga, et säilitada optimaalne temperatuur transpordi ajal.
2. Pärast kättesaamist säilitage krüoviaal kas kohe temperatuuril alla -150°C , et tagada rakkude terviklikkuse säilimine, või jätkake sammuga 3, kui on vaja koheselt kultiveerida.
3. Kohese kultiveerimise korral sulatage viali kiiresti, kastes selle 37°C veevanni puhta vee ja antimikroobse ainega, segades seda õrnalt 40-60 sekundit, kuni alles jääb väike jääklomp.
4. Tehke kõik järgmised toimingud steriilsetes tingimustes vooluhoodis, desinfitseerides krüoviaal enne avamist 70% etanooliga.
5. Avage desinfitseeritud viali ettevaatlikult ja viige rakuksuspensioon ettevaatlikult segades 15 ml tsentrifuugitorusse, mis sisaldab 8 ml toatemperatuuril olevat kasvukeskkonda.
6. Rakkude eraldamiseks tsentrifuugige segu $300 \times g$ juures 3 minutit ja visake ülejäänud külmutusvedelikku sisaldav supernatant ettevaatlikult ära.
7. Resuspendeerige rakupellet ettevaatlikult 10 ml värskes kasvukeskkonnas. Adhereerivate rakkude puhul jagage suspensioon kahe T25 kultuurkolvi vahel; suspensioonikultuuride puhul kandke kogu söötme keskkond ühte T25 kolbi, et soodustada rakkude tõhusat koostoimet ja kasvu.
8. Järgige kehtestatud subkultuuriprotokolle rakuliini jätkuvaks kasvuks ja säilitamiseks, tagades usaldusväärsed katsetulemused.

**Incubation
Atmosphere**

37°C , 5% CO_2 , niisutatud atmosfäär.

Flask Coating

Puudub

**Freezing
Procedure**

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78°C . Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige vialid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

**Shipping
Conditions**

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78°C . Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige vialid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

MA-Balb rakud | 400270

**Storage
Conditions**

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Kvaliteedikontroll / Geneetiline profiil / HLA

Sterility

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminesentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.

Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.