

RWPE-1-solut | 305217

Yleisiä tietoja

Description

RWPE-1-solulinja, joka on peräisin 54-vuotiaan valkoihoisen miehen eturauhasen epiteelistä, jolla ei ole merkkejä eturauhassyövästä, on arvokas resurssi biolääketieteellisessä tutkimuksessa, erityisesti eturauhasen biologiaa ja syöpää koskevissa tutkimuksissa. Nämä epiteelisolut, joille on ominaista adheesiokasvuominaisuudet ja tyypillinen epiteeliformologia, immortalisoitiin käyttämällä replikaatiopuutteista retrovirusta, joka kantaa ihmisen papillomavirus 18:n (HPV-18) E7-geeniä, joka inaktivoi retinoblastoomaproteiinin ja edistää solujen kuolemattomuutta.

RWPE-1-soluja, jotka ovat peräisin ihmisen normaalista eturauhasesta, käytetään eturauhassyövän tutkimuksessa, vaikka niiden androgeenireseptorin ilmentyminen on suhteellisen vaatimatonta, erityisesti verrattuna tumorigeenisiin eturauhassyöpäperäisiin solulinjoihin. Epiteelisolulinja RWPE-1 ilmentää sytokeratiineja 8 ja 18, jotka vahvistavat sen epiteelilinjaa. RWPE-1-solut ilmentävät kasvainsuppressoreita, kuten p53:a ja pRB:tä, mikä kuvastaa niiden ei-tumorigeenistä luonnetta, mutta eturauhaspesifisten merkkiaineiden, kuten Kallikrein 3:n (KLK3) tai PSA:n, ilmentyminen on yleensä vähäistä tai puuttuu kokonaan tavanomaisissa viljelyolosuhteissa.

3D-viljelmissä, kuten Matrigeliin muodostetuissa viljelmissä, ihmisen RWPE-1-solut voivat järjestäytyä acinarirakenteiksi, jotka muistuttavat normaalia eturauhasen arkkitehtuuria. RWPE-1-solut erittävät PSA:ta (eturauhaspesifinen antigeeni) vastauksena androgeenistimulaatioon, ja niiden reaktio on vähäisempi kuin eturauhassyöpäsoluminjojen. Näin ollen RWPE-1-solut tarjoavat arvokkaan mallin normaalien eturauhasen epiteelisolujen perusominaisuuksien ymmärtämiseksi.

RWPE-1:n ei-tumorigeeninen luonne toimii mallina tutkittaessa siirtymistä tumorigeeniseen transformaatioon ja syöpäsoluminjen dynamiikkaa, mukaan lukien metastaattiset eturauhassyöpäsolut ja eturauhasen karsinogeneesi. Ottamalla viljelyolosuhteisiin mukaan EGF:n ja kasvuhormonin kaltaisia tekijöitä voidaan edelleen selvittää eturauhasen liikakasvuun ja eturauhassyövän etenemiseen liittyviä reittejä. Yhteenvetona voidaan todeta, että RWPE-1-solut helpottavat eturauhassyövän kokonaisvaltaista ymmärtämistä sen alkamisesta eturauhasolulinjoissa aina sen ilmenemiseen eturauhassyöpöpotilailla.

Organism Ihminen

Tissue Eturauhanen

Synonyms RWPE1

Ominaisuudet

Age 54 vuotta

Gender Mies

Ethnicity Kaukasialainen

Morphology Epiteeli

RWPE-1-solut | 305217**Cell type** Eturauhasen epiteelisolu**Growth properties** Tarttuva**Säätelytiedot****Citation** RWPE-1 (Cytionin luettelonumero 305217)**Biosafety level** RWPE-1 on luokiteltu Saksassa bioturvallisuustasolle 1 tai 2 (BSL-1/2) suoritettavan työn tyypistä riippuen. Solulinja on peräisin ihmisen eturauhasen epiteelisolusta, jotka on transfektoitu yhdellä HPV-18-kopiolla, ja se on negatiivinen B-hepatiitin, C-hepatiitin ja HIV:n suhteen. Virushiukkasten vapautuminen on epätodennäköistä, koska HPV-18 vaatii erilaistuneita epiteelisoluja replikaatiokseen, eikä yksittäinen genomikopio yleensä johda hiukkasten muodostumiseen. Tällainen vapautuminen on vain teoreettisesti mahdollista 3D-viljelmissä (esim. organotyypissä tai lauttakulttuureissa), mutta se on poissuljettua yksikerrosviljelmissä. Koska RWPE-1:ssä on koko HPV-18-genomi, se luokitellaan geenitekniiikan kannalta riskiryhmän 2 organismiksi.**NCBI_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL_3791**Biomolekyylytiedot****Karyotype** RWPE-1-soluilla on diploidinen kromosomiploidia, ja niissä esiintyy kromosomimuunnoksia, kuten 45, X,-Y ja 51, XY.**Käsittely****Culture Medium** K-SFM (Emme toimita tätä tuotetta; harkitse muita toimittajia.) Ilmoittakaa meille, jos tarvitsette lisäapua)**Supplements** Täydennetään elatusainetta 0,05 mg/ml BPE:llä, 5 ng/ml EGF:llä. Väliaineen ei pitäisi olla täysin suodatettu. Lisää BPE:tä ja EGF:ää 10 ml:aan, ja steriilin suodatuksen jälkeen tämä seos lisätään väliaineeseen.**Dissociation Reagent** Accutase

RWPE-1-solut | 305217**Subculturing**

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreessa väliaineessa ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Freeze medium

Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotektantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Thawing and Culturing Cells

1. Varmista, että injektiopullo pysyy syväjäädetytynä toimitettaessa, sillä solut kuljetetaan kuivajäädessä, jotta optimaalinen lämpötila säilyy kuljetuksen aikana.
2. Vastaanotettaessa kryopullo joko säilytetään välittömästi alle -150 °C:n lämpötilassa solujen eheyden säilyttämiseksi tai edetään vaiheeseen 3, jos tarvitaan välitöntä viljelyä.
3. Välitöntä viljelyä varten sulata injektiopullo nopeasti upottamalla se 37 °C:n vesihauteeseen, jossa on puhdasta vettä ja antimikrobista ainetta, ja sekoittamalla sitä varovasti 40-60 sekunnin ajan, kunnes jäädästä on jäljellä pieni jäämöhkäle.
4. Suorita kaikki seuraavat vaiheet steriileissä olosuhteissa virtaushupussa ja desinfioi kryopullo 70-prosenttisellä etanolilla ennen avaamista.
5. Avaa desinfioitu injektiopullo varovasti ja siirrä solususpensio 15 ml:n sentrifugiputkeen, joka sisältää 8 ml huoneenlämpöistä elatusainetta, varovasti sekoittaen.
6. Sentrifugoi seosta 300 x g:n voimakkuudella 3 minuutin ajan solujen erottamiseksi ja hävitä varovasti supernatantti, joka sisältää jäännöspakastusmediumia.
7. Suspendoidaan solupelletti varovasti uudelleen 10 ml:aan tuoretta elatusainetta. Jos solut ovat tarttuvia, jaa suspensio kahden T25-kolvin kesken; jos kyseessä ovat suspensioviljelmät, siirrä kaikki väliaine yhteen T25-kolviin solujen tehokkaan vuorovaikutuksen ja kasvun edistämiseksi.
8. Noudata vakiintuneita aliviljelyprotokollia solulinjan jatkuvan kasvun ja ylläpidon varmistamiseksi ja luotettavien kokeellisten tulosten varmistamiseksi.

Incubation Atmosphere

37 °C, 5 % CO₂, kostutettu ilmakehä.

RWPE-1-solut | 305217**Flask Coating** Ei mitään**Freezing Procedure**

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

Shipping Conditions

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

Storage Conditions

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen tyypeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen tyypeen.

Laadunvalvonta / Geneettinen profiili / HLA**Sterility**

Mykoplasmaakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.

Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

STR-profiili

Amelogenin: x, y
CSF1PO: 13
D13S317: 8,14
D16S539: 9,11
D5S818: 12,15
D7S820: 10,11
TH01: 8,9,3
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
D3S1358: 15,16
D21S11: 29,31
D18S51: 14,16
Penta E: 5,12
Penta D: 10,13
D8S1179: 10,14
FGA: 24,25