Product sheet

Cellules TCCSUP | 305073

Informations générales

Description	La lignée cellulaire TCCSUP a été créée à partir d'un carcinome à cellules transitionnelles (CCT) de grade IV. La lignée cellulaire était dérivée d'un carcinome fortement anaplasique présentant les caractéristiques d'une malignité agressive, notamment une prolifération rapide et une faible différenciation. L'analyse cytogénétique a révélé un caryotype anormal avec l'absence d'un nombre modal clair, et des chromosomes marqueurs distincts ont été observés tout au long des passages in vitro. Morphologiquement, les cellules TCCSUP présentent des caractéristiques de type épithélial et de type fibroblastique, en accord avec l'hétérogénéité des tumeurs TCC agressives. In vitro, les cellules TCCSUP présentent une croissance robuste en culture monocouche. Cette lignée cellulaire a été largement utilisée dans la recherche sur le cancer, en particulier dans les études sur la biologie du cancer de la vessie et la réponse thérapeutique. Les cellules TCCSUP conservent notamment les antigènes associés à la tumeur, ce qui en fait un modèle précieux pour les études immunologiques et pour le développement de thérapies ciblant les antigènes. Une caractérisation moléculaire plus poussée a mis en évidence son utilité pour le criblage de médicaments à haut débit et les études génétiques. Les cellules TCCSUP ont été incluses dans des analyses protéomiques et génomiques à grande échelle, y compris des études de réseaux de protéines en phase inverse, révélant des altérations dans les voies de signalisation telles que PI3K/AKT et MAPK. Ces résultats confirment les propriétés tumorigènes de la lignée cellulaire et sa pertinence en tant que modèle pour comprendre les fondements moléculaires de la progression du cancer de la vessie.
Organism	Humain
Tissue	Vessie urinaire
Disease	Carcinome de la vessie
Synonyms	TCCSuP, TCC-SUP, TCC Sup

Caractéristiques

Age	67 ans
Gender	Femme
Ethnicity	Européen
Morphology	Épithéliale
Growth properties	Adhérent

Cellules TCCSUP | 305073

Données réglementaires

Citation	TCCSUP (numéro de catalogue 305073 de Cytion)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1738

Données biomoléculaires

Manipulation

Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w : 2 mM L-Glutamine, w : 2.2 g/L NaHCO3, w : EBSS (numéro d'article Cytion 820100a)
Supplements	Compléter le milieu avec 10 % de FBS et 1 % de NEAA
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	30 à 40 heures
Subculturing	Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.
Split ratio	1:2 à 1:5
Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine
Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Cellules TCCSUP | 305073

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmer que le flacon est toujours congelé à la livraison, car les cellules sont expédiées sur de la glace sèche pour maintenir des températures optimales pendant le transport.

2. Dès réception, soit conserver immédiatement le cryovial à des températures inférieures à -150°C pour assurer la préservation de l'intégrité cellulaire, soit passer à l'étape 3 si une mise en culture immédiate est nécessaire.

3. Pour une mise en culture immédiate, décongeler rapidement le flacon en l'immergeant dans un bain-marie à 37°C avec de l'eau propre et un agent antimicrobien, en l'agitant doucement pendant 40 à 60 secondes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit amas de glace.

4. Effectuer toutes les étapes suivantes dans des conditions stériles sous une hotte à flux, en désinfectant le cryovial avec de l'éthanol à 70 % avant de l'ouvrir.

5. Ouvrir soigneusement le flacon désinfecté et transférer la suspension cellulaire dans un tube à centrifuger de 15 ml contenant 8 ml de milieu de culture à température ambiante, en mélangeant doucement.

6. Centrifuger le mélange à 300 x g pendant 3 minutes pour séparer les cellules et jeter soigneusement le surnageant contenant le milieu de congélation résiduel.

7. Remettre doucement en suspension le culot cellulaire dans 10 ml de milieu de culture frais. Pour les cellules adhérentes, répartir la suspension entre deux flacons de culture T25 ; pour les cultures en suspension, transférer tout le milieu dans un seul flacon T25 afin de favoriser une interaction et une croissance efficaces des cellules.

8. Respecter les protocoles de sous-culture établis pour une croissance et un entretien continus de la lignée cellulaire, garantissant ainsi des résultats expérimentaux fiables.

Incubation Atmosphere

37°C, 5%$_{CO2}$, atmosphère humidifiée.

Flask Coating

Aucun

Freezing Procedure

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

Cellules TCCSUP | 305073

Shipping Conditions	Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.
Storage Conditions	Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Contrôle qualité et analyse moléculaire

Sterility	La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence. Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.
Profil STR	**Amelogenin**: x,x **CSF1PO**: 10 **D13S317**: 11,14 **D16S539**: 9,11 **D5S818**: 12 **D7S820**: 8,9 **TH01**: 6,9.3 **TPOX**: 8 **vWA**: 14,16 **D3S1358**: 15,16 **D21S11**: 27,31.2 **D18S51**: 15 **Penta E**: 12,14 **Penta D**: 9,11 **D8S1179**: 13 **FGA**: 21 **D6S1043**: 12 **D2S1338**: 17 **D12S391**: 18,20 **D19S433**: 14