

## Cellules NCI-H2347 | 305139

## Informations générales

## Description

La lignée cellulaire NCI-H2347 est une lignée cellulaire humaine de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) dérivée d'un adénocarcinome pulmonaire. Cette lignée cellulaire est largement utilisée dans les études sur la biologie du cancer du poumon, en particulier pour la recherche sur les mutations des gènes suppresseurs de tumeurs et les voies impliquant l'apoptose, la résistance à la chimiothérapie et les thérapies virales contre le cancer. NCI-H2347 possède une p53 de type sauvage, ce qui contraste avec de nombreuses lignées cellulaires de cancer du poumon qui abritent des mutations de la p53, ce qui en fait un modèle pertinent pour étudier les différences de réponse thérapeutique en fonction du statut de la p53.

Cette lignée cellulaire a été utilisée dans des expériences visant à tester l'efficacité de nouveaux traitements tels que l'ONYX-015, un adénovirus génétiquement modifié qui se réplique sélectivement dans les cellules tumorales dont la p53 n'est pas fonctionnelle et qui les détruit. Alors que l'ONYX-015 s'est avéré très efficace sur les lignées cellulaires de cancer du poumon présentant des mutations de p53, telles que NCI-H522, son effet sur NCI-H2347, dont la p53 est de type sauvage, a été limité. En outre, NCI-H2347 a été impliqué dans des études portant sur la signalisation MET, en particulier en relation avec la résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) de l'EGFR. Il a été démontré que si l'amplification du gène MET n'est pas observée dans cette lignée cellulaire, sa protéine MET peut toujours être activée par des mutations de l'EGFR, ce qui suggère une interaction complexe entre les voies de signalisation de MET et de l'EGFR.

**Organism** Humain

**Tissue** Poumon

**Disease** Adénocarcinome pulmonaire

**Synonyms** NCI-H2347, H-2347, NCIH2347

## Caractéristiques

**Age** 54 ans

**Gender** Femme

**Ethnicity** Européen

**Morphology** Épithéliale

**Growth properties** Adhérent

## Données réglementaires

## Cellules NCI-H2347 | 305139

**Citation** NCI-H2347 (numéro de catalogue Cytion 305139)

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 9606

**CellosaurusAccession** CVCL\_1550

## Données biomoléculaires

## Manipulation

**Culture Medium** RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO<sub>3</sub> (numéro d'article Cytion 820700a)

**Supplements** Compléter le milieu avec 10% de FBS

**Dissociation Reagent** Accutase

**Subculturing** Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

**Split ratio** 1:2 à 1:6

**Fluid renewal** 2 à 3 fois par semaine

**Freeze medium** Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénéisation.

## Cellules NCI-H2347 | 305139

### Thawing and Culturing Cells

1. Confirmer que le flacon est toujours congelé à la livraison, car les cellules sont expédiées sur de la glace sèche pour maintenir des températures optimales pendant le transport.
2. Dès réception, soit conserver immédiatement le cryovial à des températures inférieures à -150°C pour assurer la préservation de l'intégrité cellulaire, soit passer à l'étape 3 si une mise en culture immédiate est nécessaire.
3. Pour une mise en culture immédiate, décongeler rapidement le flacon en l'immergeant dans un bain-marie à 37°C avec de l'eau propre et un agent antimicrobien, en l'agitant doucement pendant 40 à 60 secondes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit amas de glace.
4. Effectuer toutes les étapes suivantes dans des conditions stériles sous une hotte à flux, en désinfectant le cryovial avec de l'éthanol à 70 % avant de l'ouvrir.
5. Ouvrir soigneusement le flacon désinfecté et transférer la suspension cellulaire dans un tube à centrifuger de 15 ml contenant 8 ml de milieu de culture à température ambiante, en mélangeant doucement.
6. Centrifuger le mélange à 300 x g pendant 3 minutes pour séparer les cellules et jeter soigneusement le surnageant contenant le milieu de congélation résiduel.
7. Remettre doucement en suspension le culot cellulaire dans 10 ml de milieu de culture frais. Pour les cellules adhérentes, répartir la suspension entre deux flacons de culture T25 ; pour les cultures en suspension, transférer tout le milieu dans un seul flacon T25 afin de favoriser une interaction et une croissance efficaces des cellules.
8. Respecter les protocoles de sous-culture établis pour une croissance et un entretien continus de la lignée cellulaire, garantissant ainsi des résultats expérimentaux fiables.

### Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO<sub>2</sub>, atmosphère humidifiée.

### Flask Coating

Aucun

### Freezing Procedure

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

## Cellules NCI-H2347 | 305139

### Shipping Conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

### Storage Conditions

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

## Contrôle de qualité / Profil génétique / HLA

### Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.

Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

### Profil STR

**Amelogenin:** x,x  
**CSF1PO:** 11  
**D13S317:** 12,14  
**D16S539:** 11  
**D5S818:** 11  
**D7S820:** 10,11  
**TH01:** 09. Mrz  
**TPOX:** 8  
**vWA:** 16,19  
**D3S1358:** 16  
**D21S11:** 31,31.2  
**D18S51:** 12,19  
**Penta E:** 8,19  
**Penta D:** 12  
**D8S1179:** 10,13  
**FGA:** 20,25  
**D1S1656:** 16,17.3  
**D6S1043:** 14  
**D2S1338:** 17,19  
**D12S391:** 19,2  
**D19S433:** 13,15