

Cellules TF-1 | 300434

Informations générales

Description

Les cellules TF-1 sont des érythroblastes isolés de la moelle osseuse d'un homme asiatique de 35 ans chez qui une pancytopenie sévère a été diagnostiquée en 1987. Ces cellules constituent un modèle essentiel pour l'étude des processus complexes de prolifération et de différenciation des cellules progénitrices myéloïdes. En tant que lignée cellulaire, TF-1 est largement utilisée dans la recherche hématologique pour comprendre les mécanismes sous-jacents qui régissent la régulation du cycle cellulaire et le développement des lignées myéloïdes.

Outre leur rôle principal dans la recherche hématopoïétique, les cellules TF-1 constituent un système robuste pour examiner l'impact de diverses cytokines sur la survie et la croissance des cellules. Leur dépendance à l'égard de facteurs de croissance spécifiques tels que le facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF) et l'interleukine 3 (IL-3) pour la prolifération en fait un excellent outil pour étudier les voies de signalisation médiées par les cytokines. Cette caractéristique rend également les cellules TF-1 utiles pour évaluer l'efficacité de nouveaux agents pharmacologiques visant à moduler ces voies, contribuant ainsi de manière significative aux progrès thérapeutiques dans le traitement des troubles myéloïdes et d'autres maladies apparentées.

Organism Homo sapiens (Homme)

Tissue Moelle osseuse

Disease Leucémie érythroïde aiguë

Applications La lignée cellulaire TF-1 peut être utilisée dans divers systèmes en raison de sa réactivité à de multiples cytokines. Elle constitue un bon système pour étudier la prolifération et la différenciation des cellules progénitrices myéloïdes. Sensible au GM-CSF, à l'IL-3 et à l'EPO.

Synonyms TF1, MFD-1

Caractéristiques

Age 35 ans

Gender Homme

Ethnicity Japonais

Morphology lymphoblaste

Growth properties suspension

Cellules TF-1 | 300434

Données réglementaires

Citation	TF-1 (numéro de catalogue Cytion 300434)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0559

Données biomoléculaires

Receptors expressed	Les cellules TF-1 n'expriment pas la glycophorine A ni la carbonyl anhydrase I.
Mutational profile	Mutation : p.Gln61Pro, hétérozygote ; Mutation : p.Ile251Thrfs*94, non spécifiée

Manipulation

Culture Medium	60-70 % RPMI 1640 + 20 % h.i. FBS + 10-20 % vol milieu conditionné de la lignée cellulaire 5637 (DSM ACC 35) (ou 1-5 ng/ml GM-CSF recombinant ou IL-3)
Supplements	Compléter le milieu avec 10% de FBS, pour une culture à long terme : IL-3
Doubling time	39 +- 6 heures ; 22 heures ; ~70 heures
Subculturing	Démarrer les cultures avec une densité cellulaire de 2×10^5 cellules/ml et les maintenir dans une fourchette comprise entre 1×10^5 et 1×10^6 cellules/ml. Pour la sous-culture, transférer la suspension cellulaire dans un flacon de culture cellulaire neuf prérempli avec le volume correct de milieu de culture frais.
Seeding density	$> 2 \times 10^5$ cellules/ml
Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine
Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation.

Cellules TF-1 | 300434

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmer que le flacon est toujours congelé à la livraison, car les cellules sont expédiées sur de la glace sèche pour maintenir des températures optimales pendant le transport.
2. Dès réception, soit conserver immédiatement le cryovial à des températures inférieures à -150°C pour assurer la préservation de l'intégrité cellulaire, soit passer à l'étape 3 si une mise en culture immédiate est nécessaire.
3. Pour une mise en culture immédiate, décongeler rapidement le flacon en l'immergeant dans un bain-marie à 37°C avec de l'eau propre et un agent antimicrobien, en l'agitant doucement pendant 40 à 60 secondes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit amas de glace.
4. Effectuer toutes les étapes suivantes dans des conditions stériles sous une hotte à flux, en désinfectant le cryovial avec de l'éthanol à 70 % avant de l'ouvrir.
5. Ouvrir soigneusement le flacon désinfecté et transférer la suspension cellulaire dans un tube à centrifuger de 15 ml contenant 8 ml de milieu de culture à température ambiante, en mélangeant doucement.
6. Centrifuger le mélange à 200 x g pendant 5 minutes, jeter soigneusement le surnageant contenant le milieu de congélation.
7. Suivre la procédure décrite sous Récupération après décongélation

Incubation Atmosphere

37°C, 5%_{CO2}, atmosphère humidifiée.

Flask Coating

Aucun

Freezing Procedure

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

Shipping Conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

Cellules TF-1 | 300434

Storage Conditions

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Contrôle de qualité / Profil génétique / HLA

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.

Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Profil STR

Amelogenin: x,y
CSF1PO: 13
D13S317: 8,9
D16S539: 9,12
D5S818: 13
D7S820: 12
TH01: 7,9
TPOX: 8
vWA: 15,17
D3S1358: 15
D21S11: 30
D18S51: 13
Penta E: 5,17
Penta D: 10,13
D8S1179: 11,15
FGA: 18,19

Allèles HLA

A*: '02:01:01, '33:03:01
B*: '44:03:01, '51:01:01
C*: '01:02:01, '14:03:01
DRB1*: '09:01:02G, '13:02:01
DQA1*: '01:02:01, '03:02:01
DQB1*: '03:03:02, '06:04:01
DPB1*: '02:01:02, '04:01:01
E: '01:01:01, '01:03:01