

## MM.1S cellák | 305304

## Általános információk

## Description

Az MM.1S sejtvonal az MM.1 sorozat része, amelyet egyetlen myeloma multiplexben (MM) szenvedő betegből fejlesztettek ki a betegség progressziójának és a glükokortikoid (GC) terápiára adott válasznak a különböző stádiumai tanulmányozására. Az MM.1S specifikusan érzékeny a glükokortikoidokra, például a dexametazonra, és modellként szolgál a GC által kiváltott apoptózis mechanizmusainak vizsgálatára a myeloma multiplex sejtekben. Ez az érzékenység teszi az MM.1S-t kulcsfontosságú eszközzé az MM-kezelés korai fázisainak és a GC-rezisztenciához vezető sejtes útvonalak tanulmányozásához.

Az MM.1S sejtek, a többi MM.1 vonalhoz hasonlóan, tipikus myeloma morfológiát mutatnak, beleértve a kerek sejteket excentrikusan elhelyezkedő sejtmagokkal, amelyek közül sokan kétmagvúak vagy többmagvúak. Ezek a sejtek a plazmasejtek jellegzetes markereit, mint például a CD38 és a PCA-1, expresszálják, miközben hiányoznak a tipikus B-sejt markerek, mint például a CD19 és a CD20, ami tükrözi, hogy terminálisan differenciálódott státuszuk plazmasejt. Magas szintű immunglobulin lambda ( $\lambda$ ) könnyűlánc expressziót is mutatnak, ami összhangban van eredetükkel. Ez a sejtvonal létfontosságú a MM-ben a gyógyszerhatás, a rezisztencia és az apoptózis útjainak feltárásában, különösen a GC-kezeléssel összefüggésben.

Az MM.1S egyik legfontosabb jellemzője, hogy a gyógyszerérzékenység szempontjából a funkcionális glükokortikoid-receptorokra (GR) támaszkodik. Az MM.1S-ben a vad típusú GR magas szintje lehetővé teszi, hogy a dexametazon hatékonyan indukálja az apoptózist, így értékes rendszert biztosít az e folyamat háttérében álló molekuláris események tanulmányozására. Ezt a vonalat gyakran hasonlítják össze rezisztens megfelelőjével, az MM.1R-rel, hogy a GC-rezisztencia mechanizmusait vizsgálják, ami kritikus kérdés az MM kezelésében. Az MM.1S sejtvonal együttesen betekintést nyújt a gyógyszerérzékenységbe, a betegség progressziójába és a myeloma multiplex lehetséges terápiás stratégiáiba.

## Organism

Emberi

## Tissue

Perifériás vér

## Disease

Myeloma multiplex

## Synonyms

MM1.S, MM1-S, MM-1S, MM1S, MM1S

## Jellemzők

## Age

45 év

## Gender

Női

## Ethnicity

Afroamerikai

## Morphology

Limfoblasztok

## Cell type

B sejt

**MM.1S cellák | 305304****Growth properties**

Vegyes: lazán kötött monoréteg és szuszpenzió

**Szabályozási adatok****Citation** MM.1S (Cytion katalógusszám: 305304)**Biosafety level** 1**NCBI\_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL\_8792**Biomolekuláris adatok****Products** IgA lambda**Mutational profile** Mutáció: KRAS, p.Gly12Ala (c.35G>C), heterozigóta; Mutáció: KRAS, p.Gly12Ala (c.35G>C), heterozigóta: TRAF3, p.Val536\_Asn545delValPheValAlaGlnThrValLeuGluAsninsAsp (c.1604-1630delTCTTTGTGGCCAAACTGTTCTAGAAA), homozigóta**A kezelése****Culture Medium** RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)**Supplements** A táptalajt 10% hővel inaktivált FBS-szel egészítsük ki**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Gyűjtse össze a szuszpenziós sejteket egy 15 ml-es csőbe, és óvatosan mossa át a megtapadt sejteket kalciumot és magnéziumot nem tartalmazó PBS-szel (T25 lombik esetén 3-5 ml-t, T75 lombik esetén 5-10 ml-t használjon). Vigyen fel Accutase-t (1-2 ml-t T25 lombikokhoz, 2,5 ml-t T75 lombikokhoz), biztosítva a sejtréteg teljes lefedettségét. Hagyjuk a sejteket 10 percig szobahőmérsékleten inkubálni. Az inkubációt követően egyesítsük és centrifugáljuk a szuszpenziót és az adhezív sejteket. A centrifugálás után óvatosan reszuszpendáljuk a sejt pelletet, és a sejtuszpenziót helyezük át friss tápfolyadékot tartalmazó új lombikokba.**Freeze medium** Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kioltás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

**MM.1S cellák | 305304****Thawing and  
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a kriofülkét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet  $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejtkölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

**Incubation  
Atmosphere**

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , párasított légkör.

**Flask Coating**

Nincs

**Freezing  
Procedure**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

**Shipping  
Conditions**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

## MM.1S cellák | 305304

### Storage Conditions

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

## Minőségellenőrzés / Genetikai profil / HLA

### Sterility

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatói módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejt kultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.