

## NCI-H2052 sejtek | 305836

## Általános információk

## Description

Az NCI-H2052 egy humán mezotelióma sejtvonat, amely egy felnőtt, rosszindulatú mezoteliómával diagnosztizált beteg pleurális biopsziás mintájából származik. Az NCI-Navy Medical Oncology Branch sejtvonatpanel részeként, reprodukálható növekedési jellemzői és meghatározott szövettani eredete miatt széles körben használják a mezotelióma-kutatásban. A sejtvonat az IRB által jóváhagyott protokollok alapján hozták létre, amelyek célja klinikailag jegyzetelt rákmodellek létrehozása volt, így különösen értékes az in vitro viselkedést a betegek betegségének jellemzőivel összekötő transzlációs vizsgálatokhoz.

Fenotípusosan az NCI-H2052 epithelialis morfológiát mutat, ami a mezotelióma epithelioid altípusának felel meg. A sejtek in vitro adherens monolayerként növekednek, és 10% magzati szarvasmarha szérummal kiegészített RPMI-1640 tápfolyadékban tartják őket. A genomikai profilalkotás a mezoteliómára jellemző elváltozásokat azonosított, beleértve a CDKN2A és NF2-t érintő útvonalak diszregulációját, bár az NCI-H2052 specifikusan megőrzi a vad típusú BAP1-et, és más mezotelióma modellekhez képest viszonylag alacsony mutációs terhet mutat. Ezek a molekuláris jellemzők az NCI-H2052-t referencia modellként pozícionálják a mezotelióma patogenezisének és terápiás válaszána tanulmányozására, különösen a BAP1 által vezérelt fenotípusokat kizáró kontextusokban.

Ez a sejtvonat bekerült átfogó farmakogenomikai és transzkriptomikai adathalmazokba, ahol hozzájárul a mezotelióma altípusainak és terápiás érzékenységének összehasonlító elemzéséhez. Mérsékelt érzékenységet mutatott a PI3K/mTOR tengelyt célzó szerekre, és nagy átteresztőképességű szűrési platformokban használták a potenciális szintetikus letális kölcsönhatások és új kezelési megközelítések azonosítására. Molekuláris profilja és eredete miatt az NCI-H2052 továbbra is a mezotelióma gyógyszerfejlesztés és a molekuláris jellemzési vizsgálatok sarokköve marad.

<b>Organism</b>	Emberi
<b>Tissue</b>	Mellhártya folyadékgyülem
<b>Disease</b>	Pleura szarkomatoid mesothelioma
<b>Synonyms</b>	H2052, H-2052, H2052_MM, NCIH2052

## Jellemzők

<b>Age</b>	65 év
<b>Gender</b>	Férfi
<b>Ethnicity</b>	Kaukázusi
<b>Morphology</b>	Epithelialis
<b>Cell type</b>	Epithelszerű

## NCI-H2052 sejtek | 305836

**Growth properties** Adherent

## Szabályozási adatok

**Citation** NCI-H2052 (Cytion katalógusszám: 305836)

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 9606

**CellosaurusAccession** CVCL\_1518

## Biomolekuláris adatok

**Mutational profile** Mutáció: CDKN2A, homozigóta. Gén deléció, LATS2, homozigóta. Mutáció, NF2, Simple, p.Arg341Ter (c.1021C>T), homozigóta, RASSF2, Simple, p.Glu294Ter (c.880G>T), heterozigóta, TERT, Simple, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), nem meghatározott, Megjegyzés=A promóterben (PubMed=31068700)

## A kezelése

**Culture Medium** RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

**Supplements** A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

**Dissociation Reagent** Accutase

**Doubling time** 48 óra

**Fluid renewal** hetente 2-3 alkalommal

**Freeze medium** Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

## NCI-H2052 sejtek | 305836

**Thawing and  
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a krioüklét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet  $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejt kölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

**Incubation  
Atmosphere**

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , párasított légkör.

**Flask Coating**

None

**Shipping  
Conditions**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

**Storage  
Conditions**

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül  $-150$  és  $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleten. A  $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

NCI-H2052 sejtek | 305836

**Minőségellenőrzés / Genetikai profil / HLA**

**Sterility**

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejt kultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.