

UM-SCC-127 sejtek | 305725

Általános információk

Description

Az UM-SCC-127 a Michigan Egyetem UM-SCC-paneljéből származó humán HNSCC sejtvonala. A magasabb sorszámú UM-SCC-sorozat részeként ez a gyűjtemény egyik legújabban létrehozott vonalát képviseli. A vonal adhezív módon növekszik, epiteliális jellegű morfológiával rendelkezik, és modellt nyújt a HNSCC-vel kapcsolatos összehasonlító molekuláris és farmakológiai vizsgálatokhoz.

Alkalmazható HNSCC-kutatásokban, gyógyszerérzékenységi vizsgálatokban, molekuláris útvonalak elemzésében, valamint az UM-SCC többvonalas panelkísérletekben. Alkalmas farmakológiai vizsgálatokhoz és xenotranszplantációs modellekhez.

Organism

Emberi

Tissue

Fej és nyak, szájüreg

Disease

Fej és nyak laphámsejtes karcinóma (HNSCC)

Applications

HNSCC-kutatás; gyógyszerérzékenység; molekuláris útvonalak elemzése; UM-SCC panelvizsgálatok; xenotranszplantációs modellek

Jellemzők

Age

Meghatározatlan életkor

Gender

Meghatározatlan nemű

Ethnicity

Etnikai hovatartozás nem megadva

Morphology

Epithelszerű

Cell type

Epithel sejtek

Growth properties

Adherent

Szabályozási adatok

Citation

UM-SCC-127 (Cytion katalógusszám: 305725)

Biosafety level

1

UM-SCC-127 sejtek | 305725

NCBI_TaxID	9606
------------	------

Biomolekuláris adatok

A kezelése

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO ₃ (Cytion 820700a cikkszám)
----------------	---

Supplements	A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel
-------------	--

Dissociation Reagent	Accutase, 5 perc, 37 °C
----------------------	-------------------------

Doubling time	kb. 24–48 óra
---------------	---------------

Subculturing	Távolítsuk el a tápközeget, mossuk le kalcium- és magnéziummentes PBS-sel, öntsünk rá Accutase-t, inkubáljuk 8–10 percig szobahőmérsékleten, szuszpendáljuk újra a tápközegetben, centrifugáljuk 300×g-vel 3 percig, öntsük ki a felülúszót, majd ültessük át friss tápközegetbe.
--------------	---

Split ratio	1–5
-------------	-----

Seeding density	$1-3 \times 10^4$ sejt/cm ²
-----------------	--

Fluid renewal	2-3 naponta
---------------	-------------

Freeze medium	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kioltás után életképesség érdekében.
---------------	--

UM-SCC-127 sejtek | 305725

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát -150°C alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott 37°C -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és felnyitás előtt fertőtlenítsük a krioüveget 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet $200 \times g$ -nél 5 percig, a fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót óvatosan dobjuk el.
7. Kövesse a felolvasztás utáni helyreállításnál leírt eljárást

**Incubation
Atmosphere**

37°C , 5% CO_2 , párasított légkör.

**Shipping
Conditions**

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78°C -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

**Storage
Conditions**

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196°C közötti hőmérsékleten. A -80°C -on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Minőségellenőrzés és molekuláris elemzés