

HuH-6 sejtek | 305092

Általános információk

Description

A HuH-6 sejtvonal egy humán hepatoblasztóma sejtvonal, amely egy olyan gyermek májszövetéből származik, akinél hepatoblasztómát diagnosztizáltak, egy ritka rosszindulatú májdaganatot, amely elsősorban gyermekbetegeket érint. A HuH-6 sejtek a májvonalra jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek, beleértve a hepatocitákkal kapcsolatos markerek, például az alfa-fetoprotein (AFP), az albumin és a citokeratinok expresszióját. Ezek a sejtek kultúrában tapadnak és epiteliális morfológiát mutatnak, így értékes in vitro modellként szolgálnak a máj fejlődésének, a hepatoblasztóma patogenezisének és a májspecifikus metabolikus funkcióknak a tanulmányozására.

A HuH-6 sejtek különösen hasznosak a gyermekkori májrákkal kapcsolatos kutatásokban, mivel megtartják a primer hepatoblasztóma szövetekben megfigyelt molekuláris jellemzők nagy részét. Ezek közé tartozik a Wnt/ β -katenin jelátvitel aktiválása, amely útvonal gyakran szerepet játszik a hepatoblasztóma tumorigenezisében. A sejtvonalat a kemoterápiás szerek hatását, a gyógyszer-metabolizmust és a rezisztencia mechanizmusait vizsgáló tanulmányokban, valamint a tumor progressziójával és differenciálódásával összefüggő génexpressziós profilok feltárásában is alkalmazták. A HuH-6 sejtek reprodukálhatóságuknak és következetes növekedési jellemzőiknek köszönhetően robusztus modellrendszerként szolgálnak mind a májrák alapkutatásához, mind a preklinikai gyógyszerészéshez.

Organism

Emberi

Tissue

Máj

Disease

Hepatoblastoma

Synonyms

HUH-6, HuH 6, HuH6, HuH6, HUH6, Huh6

Jellemzők

Age

1 év

Gender

Férfi

Ethnicity

Ázsiai

Morphology

Epithelialis

Growth properties

Adherent

Szabályozási adatok

HuH-6 sejtek | 305092

Citation	HuH-6 (Cytion katalógusszám: 305092)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_4381

Biomolekuláris adatok

A kezelése

Culture Medium	DMEM, w: 4,5 g/L glükóz, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO ₃ , w: 1,0 mM nátrium-piruvát (Cytion cikkszám 820300a)
Supplements	A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.
Fluid renewal	hetente 2-3 alkalommal
Freeze medium	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krioindukált stressz csökkentése érdekében.

HuH-6 sejtek | 305092

Thawing and Culturing Cells

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát -150 °C alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott 37 °C -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a kriofülkét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejt kölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

Incubation Atmosphere

37 °C , 5% CO_2 , párasított légkör.

Flask Coating

Nincs

Freezing Procedure

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

Shipping Conditions

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

HuH-6 sejtek | 305092

Storage Conditions

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Minőségellenőrzés / Genetikai profil / HLA

Sterility

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejt kultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.