

## CAL 27 sejtek | 305029

## Általános információk

## Description

A Cal 27 sejtek egy emberi laphámsejtes karcinóma sejtvonala, amely egy 56 éves férfi nyelvében 1982-ben talált primer tumorból származik. A Cal 27 sejtek epithelialis morfológiájúak, és széles körben használják a tudományos kutatásokban a szájüregi karcinogenezis, a laphámsejtes és oropharyngeális karcinóma biológiájának tanulmányozására, valamint a fej- és nyaki rákok potenciális terápiás szereinek értékelésére.

A Cal27 sejtvonalat számos kutatási alkalmazásban alkalmazták, többek között a sejtproliferáció, az apoptózis, különösen a rákellenes gyógyszerek érzékenységevel összefüggésben, valamint az új rákellenes szerek, a migráció és az invázió vizsgálatában. A különböző kemoterápiás szerek, például a ciszplatin, a sugárterápia és a célzott terápiák hatásainak vizsgálatára is használták.

A Cal-27 adenozkármiás karcinóma sejtvonala továbbá xenotranszplantátumként is használják, amely a tumor angiogenezisének, a nyirokcsomó-metasztázisnak, valamint az áttétképződés és a kemorezisztencia mechanizmusainak tanulmányozására szolgál. Érdekes a Cal27 sejtek kölcsönhatása az  $\alpha6\beta4$  és  $\alpha v\beta3$  integrinokkal, mivel ezek a molekulák döntő szerepet játszanak a sejtadhézióban. Vizsgálatokban vizsgálták, hogy milyen hatással van az ezen útvonalakat célzó gyógyszerek, például a vismodegib és az itrakonazol, amelyekről ismert, hogy modulálják a hedgehog-útvonalat.

Összességében a Cal 27 sejtvonala robusztus modellként szolgál a szájüregi laphámsejtes karcinómák komplex biológiájának vizsgálatára és új terápiás beavatkozások tesztelésére, hozzájárulva ezzel a szájüregi rákok kezelésének és megelőzésének fejlődéséhez.

**Organism** Emberi

**Tissue** Nyelv

**Disease** Nyelv laphámsejtes karcinóma

**Synonyms** Cal-27, CAL 27, Cal 27, Cal 27, CAL27, Cal27, Centre Antoine Lacassagne-27

## Jellemzők

**Age** 56 év

**Gender** Férfi

**Morphology** Epithelialis

**Growth properties** Adherent

## Szabályozási adatok

## CAL 27 sejtek | 305029

<b>Citation</b>	CAL 27 (Cytion katalógusszám: 305029)
-----------------	---------------------------------------

<b>Biosafety level</b>	1
------------------------	---

<b>NCBI_TaxID</b>	9606
-------------------	------

<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_1107
-----------------------------	-----------

## Biomolekuláris adatok

<b>Tumorigenic</b>	Igen
--------------------	------

## A kezelése

<b>Culture Medium</b>	DMEM, w: 4,5 g/L glükóz, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO <sub>3</sub> , w: 1,0 mM nátrium-piruvát (Cytion cikkszám 820300a)
-----------------------	--

<b>Supplements</b>	A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel
--------------------	--

<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
-----------------------------	----------

<b>Subculturing</b>	Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.
---------------------	---

<b>Fluid renewal</b>	hetente 2-3 alkalommal
----------------------	------------------------

<b>Freeze medium</b>	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.
----------------------	--

## CAL 27 sejtek | 305029

**Thawing and  
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát  $-150\text{ °C}$  alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott  $37\text{ °C}$ -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a kriofülkét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet  $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejtkölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

**Incubation  
Atmosphere**

$37\text{ °C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , párasított légkör.

**Flask Coating**

Nincs

**Freezing  
Procedure**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül  $-78\text{ °C}$ -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

**Shipping  
Conditions**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül  $-78\text{ °C}$ -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

## CAL 27 sejtek | 305029

### Storage Conditions

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

## Minőségellenőrzés / Genetikai profil / HLA

### Sterility

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejt kultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.