Product sheet

B16-F10 sejtek | 305157

Általános információk

Description	A B16-F10 sejtvonal az egér B16 melanoma sejtvonalának egy alvonala, amely egy egér spontán bőrdaganatából származik. Ezeket a sejteket agresszív metasztatikus potenciál jellemzi, különösen a tüdőbe, ami értékes modellé teszi őket a melanoma progressziójának és metasztázisának tanulmányozására. A B16-F10 sejtek magas melanintartalommal rendelkeznek, ami hozzájárul pigmentációjukhoz, és különböző vizsgálatokban markerként használják a sejtproliferáció és a tumor növekedésének nyomon követésére. A B16-F10-et tízszeres szelektív eljárással nyerték a Fidler-módszer alkalmazásával, ami fokozza metasztatikus képességét a B16-F0 szülővonalhoz és a B16-F1 alvonalhoz képest, amely egyszeri szelektív eljáráson esett át. A B16-F10 sejteket széles körben használják a rákkutatásban, mivel képesek tumorokat képezni szinogén C57BL/6 egerekben, ami következetes és reprodukálható modellt biztosít az in vivo vizsgálatokhoz. Ezek a sejtek különböző melanomával kapcsolatos antigéneket expresszálnak, amelyek kulcsfontosságúak az immunválaszok vizsgálatához és az immunterápiák kifejlesztéséhez. A B16-F10 sejteket emellett a kemoterápiás szerek hatékonyságának és a melanoma gyógyszerrezisztenciájának hátterében álló molekuláris mechanizmusok értékelésére is használják. A sejtvonal genetikai profilja és a különböző kísérleti körülmények közötti viselkedése betekintést nyújt a melanoma áttétképződésében szerepet játszó útvonalakba, segítve ezzel a célzott terápiás stratégiák kifejlesztését. Figyelemre méltó, hogy a B16-F10 származéka, a B16-BL6 még nagyobb invazív aktivitást mutat, így a B16 sorozat átfogó modellrendszerré válik a melanoma biológiájának és terápiájának különböző aspektusainak tanulmányozására.
Organism	Egér
Tissue	Bőr
Disease	Egér melanoma
Synonyms	B16/F10, B16 F10, B16F10, B16 melanoma F10, B16 melanoma F10

Jellemzők

Breed/Subspecies	C57BL/6
Gender	Férfi
Morphology	Orsó alakú és hámszerű sejtek keveréke
Growth properties	Adherent

Szabályozási adatok

Citation	B16-F10 (Cytion katalógusszám: 305157)

B16-F10 sejtek | 305157

Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_0159

Biomolekuláris adatok

Products	Melanin

A kezelése

Culture Medium	DMEM, w: 4,5 g/L glükóz, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM nátrium-piruvát (Cytion cikkszám 820300a)
Supplements	A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.
Fluid renewal	hetente 2-3 alkalommal
Freeze medium	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

B16-F10 sejtek | 305157

Thawing and Culturing Cells

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát -150 °C alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott 37 °C-os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a kriofülkét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtszuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet 300 x g-n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejtpelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejtkölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejtvonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

Incubation Atmosphere

37°C, 5%$_{CO2}$, párásított légkör.

Flask Coating

Nincs

Freezing Procedure

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

Shipping Conditions

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

Storage Conditions	Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Minőségellenőrzés és molekuláris elemzés

Sterility	A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.