

## U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 sejtek | 300664

## Általános információk

## Description

Az U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 egy genomszerkesztett humán osteosarcoma sejtvonala, amely U2OS sejtekből származik, és amelyben az endogén SEH1L (SEH1) gént CRISPR/Cas9 technológiával módosították, hogy egy in-frame SNAPf tagot kódoljon. Az SEH1 a Y-komplex (más néven NUP107-160 komplex) egyik komponense, amely a nukleáris póruskomplex (NPC) központi szerkezeti modulja, és hozzájárul a pórusváz szerkezetének összeállításához és stabilitásához. A SNAPf kódoló szekvencia beillesztésével az endogén lókusztba a címkézett SEH1 fehérje natív szabályozó kontroll alatt expresszáldódik, megőrizve a fiziológiai expressziós szinteket és minimalizálva a nukleáris pórus összetételének zavarait.

A SNAPf tag a SNAP-tag egy módosított, gyorsan reagáló változata, amely kovalens kötással kapcsolódik a benzilguanin-konjugált szubsztrátokhoz, lehetővé téve a szelektív és stabil fluoreszcens jelölést élő vagy fixált sejtekben. Az U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 sejtekben a fúziós fehérje az NPC eloszlására jellemző pontszerű mintázatban lokalizálódik a magmembránban. Mivel a jelölés endogén fehérjeszinteken történik, ez a rendszer kiválóan alkalmas kvantitatív fluoreszcens mikroszkópiára, szuperfelbontású képalkotásra és egyrészecske-követési elemzésekre, amelyek célja az NPC szerveződésének és sztöchiometriájának feltárása. Az U2OS sejtek lapos morfológiája és nagy magjai tovább megkönnyítik a magmembrán struktúráinak nagy felbontású vizualizálását.

A SEH1 részt vesz az NPC biogenezisében, és szerepet játszik a mitózis során a kinetokórhoz kapcsolódó folyamatokban is. Ennek megfelelően ez a sejt vonal robusztus platformot biztosít a sejt ciklus-függő NPC összeszerelésének és szétszerelésének, a Y-komplex térbeli szerveződésének a pórusvázon belül, valamint a SEH1 potenciális kettős szerepének a sejtmembránon és a mitotikus kinetokórokon történő vizsgálatához. Az U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 lehetővé teszi a nukleáris pórusok szerkezetének és dinamikájának mechanisztikus vizsgálatát fiziológiailag releváns expressziós körülmények között.

**Organism** Emberi

**Tissue** Csont

**Disease** Osteosarcoma

## Jellemzők

**Age** 15 év

**Gender** Női

**Ethnicity** Kaukázusi

**Morphology** Epithelszerű

**Growth properties** Adherent

## U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 sejtek | 300664

## Szabályozási adatok

<b>Citation</b>	U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 (Cytion katalógusszám 300664)
<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	9606
<b>Depositor</b>	Az Ellenberg Labor (EMBL)
<b>GMO Status</b>	GMO-S1: Ez a humán osteosarcoma sejtvonala (U2OS-CRISPR-CRISPR-SNAPf-SEH1) egy CRISPR-közvetített SNAPf-SEH1 fúziót tartalmaz, amely lehetővé teszi a SEH1 nukleoporin szelektív jelölését. A módosítás stabilan jelen van. Ez az osztályozás csak Németországban érvényes, máshol ettől eltérhet.

## Biomolekuláris adatok

<b>Protein expression</b>	SEH1, SNAPf-tag
---------------------------	-----------------

## A kezelése

<b>Culture Medium</b>	McCoy's 5a, w: 3,0 g/L glükóz, w: stabil glutamin, w: 2,0 mM nátrium-piruvát, w: 2,2 g/L NaHCO <sub>3</sub> (Cytion cikkszám: 820200a)
<b>Supplements</b>	A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel, 3,0 g/L glükózzal, stabil glutaminnal, 2,0 mM nátrium-piruváttal, 2,2 g/L NaHCO <sub>3</sub> -mal, 1% NEAA-val
<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
<b>Subculturing</b>	Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percre hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuspendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percre. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.
<b>Freeze medium</b>	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krioindukált stressz csökkentése érdekében.

**U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 sejtek | 300664****Thawing and  
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát  $-150\text{ °C}$  alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott  $37\text{ °C}$ -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a kriofülkét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet  $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejtkölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

**Incubation  
Atmosphere**

$37\text{ °C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , párasított légkör.

**Flask Coating**

Nincs

**Freezing  
Procedure**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül  $-78\text{ °C}$ -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

**Shipping  
Conditions**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül  $-78\text{ °C}$ -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

## U2OS-CRISPR-SNAPf-SEH1 sejtek | 300664

### Storage Conditions

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

## Minőségellenőrzés / Genetikai profil / HLA

### Sterility

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejt kultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.