

K7M2 wt Sejtek | 305188

Általános információk

Description

A K7M2 wt sejtvonal egy egér-osteoszarkómából származik, és gyakran használják a rákkutatásban, különösen az osteoszarkóma patogenezisét és terápiás válaszát vizsgáló tanulmányokban. Ezt a sejtvonalat nagy metasztatikus potenciál jellemzi, ami felbecsülhetetlen értékű modellt tesz a rákos áttétképződés alapjául szolgáló mechanizmusok tanulmányozására és az áttétképződés elleni szerek tesztelésére. A K7M2 wt sejtek tipikus epiteliális morfológiát mutatnak, és robusztus növekedést mutatnak in vitro, ami megkönnyíti a különböző kísérleti alkalmazásokat, beleértve a génexpressziós vizsgálatokat, a gyógyszerek szűrését és a genetikai manipulációt.

A kutatók a K7M2 wt sejtvonalat az oszteoszarkóma progressziójában szerepet játszó molekuláris és sejt folyamatok feltárására használják. A vizsgálatok gyakran a jelátviteli útvonalakra, például a Wnt/ β -katenin és a PI3K/AKT útvonalakra összpontosítanak, amelyek döntő szerepet játszanak a tumor növekedésében és az áttétképződésben. A K7M2 wt sejtek genetikai profilja az oszteoszarkómában gyakori elváltozásokat tartalmaz, betekintést nyújtva e rosszindulatú daganat genetikai mozgatórugóiba. Továbbá ez a sejtvonal fontos szerepet játszik az új terápiás megközelítések, köztük a célzott terápiák és az immunterápiák preklinikai tesztelésében, és platformot kínál a kutatási eredmények potenciális klinikai alkalmazásokba történő átültetéséhez.

Organism

Egér

Tissue

Ascites

Disease

Egér oszteoszarkóma

Metastatic site

Tüdő

Synonyms

K7M2-WT, K7M2

Jellemzők

Breed/Subspecies

BALB/c

Age

895 nap

Gender

Női

Cell type

Osteoblast

Growth properties

Adherent

Szabályozási adatok

K7M2 wt Sejtek | 305188

Citation	K7M2 wt (Cytion katalógusszám: 305188)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_V455

Biomolekuláris adatok

Receptors expressed	Komplement(C3), expresszált, Fc receptor, IgG, nagy affinitású I(Fcgr1), expresszált
Tumorigenic	Igen

A kezelése

Culture Medium	DMEM, w: 4,5 g/L glükóz, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO ₃ , w: 1,0 mM nátrium-piruvát (Cytion cikkszám 820300a)
Supplements	A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.
Fluid renewal	hetente 2-3 alkalommal
Freeze medium	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

K7M2 wt Sejtek | 305188**Thawing and
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát -150 °C alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott 37 °C -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a kriofülkét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejt kölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

**Incubation
Atmosphere**

37 °C , 5% CO_2 , párasított légkör.

Flask Coating

Nincs

**Freezing
Procedure**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

**Shipping
Conditions**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

K7M2 wt Sejtek | 305188

Storage Conditions

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Minőségellenőrzés / Genetikai profil / HLA

Sterility

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatói módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejt kultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.