

Sel PC-12 | 500311

Informasi umum

Description

Sel PC-12 adalah garis sel yang berasal dari pheochromocytoma medula adrenal tikus. Sel-sel ini berasal dari embrio, tumbuh melekat dan menyerupai campuran sel neuroblastik dan eosinofilik. Sel PC-12 adalah sel katekolamin yang mensintesis, menyimpan, dan melepaskan norepinefrin dan dopamin. Sel ini memiliki diameter sekitar 10-12 mikron dan merupakan sel kecil yang bentuknya tidak beraturan. Garis sel PC12 adalah model sel neuron klasik karena kemampuannya untuk memperoleh fitur neuron simpatis ketika berhadapan dengan faktor pertumbuhan saraf (NGF).

Studi tentang regulasi dopamin telah menunjukkan bahwa sel PC12 mensintesis, melepaskan, dan mengambil kembali dopamin dan telah dikarakterisasi secara ekstensif untuk neurosekresi dan keberadaan saluran ion dan reseptor neurotransmitter. Selain itu, proporsi relatif dari berbagai subtype saluran Ca berubah selama diferensiasi. Garis sel PC12 adalah model sel neuron mapan yang sangat berguna dalam mempelajari respons seluler terhadap faktor pertumbuhan saraf (NGF) dan bagaimana hal ini mengarah pada ekspresi protein spesifik diferensiasi dan diferensiasi. Ketika dikultur dalam NGF, sel PC12 berdiferensiasi menjadi neuron ganglion simpatis secara morfologis dan fungsional. Diferensiasi ini dihasilkan dari induksi fenotipe neuron yang dapat dibalik oleh NGF. Pelapisan kolagen telah terbukti menguntungkan untuk mencapai karakteristik neuron dalam hal panjang dan kepadatan neurit dengan pengobatan NGF.

Sel PC12 bersifat tumorigenik dan berasal dari tikus jantan strain New England Deaconess Hospital. Garis sel PC-12 memiliki 40 kromosom, 38 autosom, ditambah xY. Faktor pertumbuhan saraf (NGF) diekspresikan dalam sel PC12, dan paparan NGF adalah salah satu regulator penting diferensiasi sel.

Sebagai kesimpulan, sel PC12 adalah sistem model serbaguna dan banyak digunakan dalam neurobiologi karena kemampuannya untuk memperoleh fitur neuron simpatis ketika berhadapan dengan faktor pertumbuhan saraf (NGF). Sel-sel ini telah dikarakterisasi secara ekstensif untuk neurosekresi, saluran ion, dan reseptor neurotransmitter. Keserbagunaannya yang ekstrem untuk pengujian farmakologis dan digunakan sebagai model yang mapan untuk mempelajari proliferasi dan diferensiasi sel saraf menjadikannya alat yang berharga dalam penelitian neurobiologi.

Organism	Tikus
Tissue	Kelenjar adrenal
Disease	Pheochromocytoma
Synonyms	PC 12, PC12

Karakteristik

Age	Tidak ditentukan
Gender	Laki-laki
Ethnicity	Bahasa Jepang

Sel PC-12 | 500311

Morphology Poligonal

Growth properties Gumpalan kecil dalam suspensi, kurang melekat, bercak-bercak pada kolagen.

Data Peraturan

Citation PC-12 (Nomor katalog Cytion 500311)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 10116

CellosaurusAccession CVCL_S979

Data Biomolekuler

Receptors expressed Faktor pertumbuhan saraf (NGF)

Tumorigenic Ya, di Rumah Sakit New England Deaconess strain tikus

Products Katekolamin, dopamin

Karyotype 40 kromosom, 38 autosom ditambah xY

Penanganan

Culture Medium RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (Nomor artikel Cytion 820700a)

Supplements Tambahkan media dengan 10% FBS

Subculturing Sel suspensi: Pindahkan sel dari media dengan memipet dengan media segar. Untuk mendapatkan sel tunggal, masukkan suspensi beberapa kali melalui jarum pengukur 22 dan buang ke dalam labu yang baru. Tumbuh di atas kolagen: Untuk menghilangkan sel yang melekat, gunakan protokol standar berikut. Buang media dan bilas sel yang melekat menggunakan PBS tanpa kalsium dan magnesium (3-5 ml PBS untuk T25, 5-10 ml untuk labu kultur sel T75). Tambahkan TrypleExpress (1-2 ml per T25, 2,5 ml per labu kultur sel T75), lembaran sel harus tertutup seluruhnya. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Resuspensi sel dengan hati-hati, penambahan medium bersifat opsional tetapi tidak perlu, dan buang ke dalam labu baru yang berisi medium segar.

Sel PC-12 | 500311

Seeding density 1×10^4 sel/cm²

Fluid renewal 2 hingga 3 kali per minggu

Post-Thaw Recovery Setelah dicairkan, tanam sel pada kepadatan 5×10^4 sel/cm² dan biarkan sel pulih dari proses pembekuan serta menempel setidaknya selama 48 jam.

Freeze medium Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan 50% media basal + 40% FBS + 10% DMSO, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Thawing and Culturing Cells

1. Pastikan botol tetap dalam keadaan beku pada saat pengiriman, karena sel dikirim dengan es kering untuk mempertahankan suhu optimal selama perjalanan.
2. Setelah diterima, segera simpan cryovial pada suhu di bawah -150°C untuk memastikan pelestarian integritas sel, atau lanjutkan ke langkah 3 jika kultur segera diperlukan.
3. Untuk kultur segera, segera cairkan botol dengan merendamnya dalam penangas air bersuhu 37°C dengan air bersih dan agen antimikroba, aduk perlahan selama 40-60 detik hingga gumpalan es kecil tetap ada.
4. Lakukan semua langkah selanjutnya dalam kondisi steril di dalam tudung alir, desinfektan kriovial dengan etanol 70% sebelum dibuka.
5. Buka botol yang telah didesinfeksi dengan hati-hati dan pindahkan suspensi sel ke dalam tabung sentrifugasi 15 ml yang berisi 8 ml media kultur suhu kamar, aduk perlahan.
6. Sentrifus campuran pada 300 x g selama 3 menit untuk memisahkan sel dan dengan hati-hati membuang supernatan yang mengandung sisa media pembekuan.
7. Resuspensi pelet sel dengan hati-hati dalam 10 ml medium kultur segar. Untuk sel yang melekat, bagi suspensi di antara dua labu kultur T25; untuk kultur suspensi, pindahkan semua media ke dalam satu labu T25 untuk mendorong interaksi dan pertumbuhan sel yang efektif.
8. Patuhi protokol subkultur yang telah ditetapkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan garis sel yang berkelanjutan, memastikan hasil eksperimental yang andal.

Incubation Atmosphere 37°C, 5% CO₂, atmosfer yang dilembabkan.

Sel PC-12 | 500311

Flask Coating Kolagen

Freezing Procedure

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

Shipping Conditions

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

Storage Conditions

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Kontrol kualitas / Profil genetik / HLA

Sterility

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.

Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Profil STR

Rat_D1Wox31: 100
Rat_D2Wox37: 156
Rat_D19Wox11: 228
Rat_D10Wox8: 262.266
Rat_D4Wox7: 145
Rat_D2Wox27: 207
Rat_D5Rat33: 116, 118, 120
Rat_D10Wox11: 174
Rat_D1Wox23: 226,23
Rat_D12Wox1: 402.406
Rat_D6Wox2: 104
Rat_D8Wox7: 182
Rat_D6Cebr1: 229, 231, 233
SRY: x,y