

Cellule UM-SCC-127 | 305725

Informazioni generali

Description

UM-SCC-127 è una linea cellulare umana di HNSCC proveniente dal panel UM-SCC dell'Università del Michigan. Essendo parte della serie UM-SCC con numeri più elevati, rappresenta una delle linee più recentemente istituite in questa collezione. La linea cresce in modo aderente con morfologia di tipo epiteliale e costituisce un modello per studi comparativi molecolari e farmacologici sull'HNSCC.

Utilizzabile nella ricerca sull'HNSCC, negli studi di sensibilità ai farmaci, nell'analisi delle vie molecolari e negli esperimenti con il pannello multilinea UM-SCC. Adatta per saggi farmacologici e modelli di xenotrapianto.

Organism

Umano

Tissue

Testa e collo, cavità orale

Disease

Carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC)

Applications

Ricerca sull'HNSCC; sensibilità ai farmaci; analisi delle vie molecolari; studi sul pannello UM-SCC; modelli di xenotrapianto

Caratteristiche

Age

Età non specificata

Gender

Sesso non specificato

Ethnicity

Etnia non specificata

Morphology

Simile all'epitelio

Cell type

Cellule epiteliali

Growth properties

Aderente

Dati normativi

Citation

UM-SCC-127 (codice catalogo Cytion 305725)

Biosafety level

1

NCBI_TaxID

9606

Cellule UM-SCC-127 | 305725

Dati biomolecolari

Manipolazione

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO ₃ (articolo Cytion numero 820700a)
-----------------------	---

Supplements	Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS
--------------------	---

Dissociation Reagent	Accutase, 5 min., 37 °C
-----------------------------	-------------------------

Doubling time	circa 24-48 ore
----------------------	-----------------

Subculturing	Rimuovere il terreno di coltura, lavare con PBS privo di calcio e magnesio, coprire con Accutase, incubare per 8-10 min a temperatura ambiente, risospendere nel terreno di coltura, centrifugare a 300×g per 3 min, eliminare il surnatante, ripiantare in terreno di coltura fresco.
---------------------	--

Split ratio	Da 1 a 5
--------------------	----------

Seeding density	da 1 a 3×10^4 cellule/cm ²
------------------------	--

Fluid renewal	Ogni 2 o 3 giorni
----------------------	-------------------

Freeze medium	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo + 10% DMSO per ottenere un'adeguata vitalità post-scongelo.
----------------------	--

Cellule UM-SCC-127 | 305725

Thawing and Culturing Cells

1. Verificare che la fiala rimanga profondamente congelata al momento della consegna, poiché le cellule vengono spedite con ghiaccio secco per mantenere le temperature ottimali durante il trasporto.
2. Al ricevimento, conservare immediatamente la criovial a temperature inferiori a -150°C per garantire la conservazione dell'integrità cellulare, oppure procedere al punto 3 se è necessaria una coltura immediata.
3. Per la coltura immediata, scongelare rapidamente la fiala immergendola in un bagno d'acqua a 37°C con acqua pulita e un agente antimicrobico, agitando delicatamente per 40-60 secondi finché non rimane un piccolo grumo di ghiaccio.
4. Eseguire tutte le fasi successive in condizioni di sterilità in una cappa a flusso, disinfettando la criovial con etanolo al 70% prima dell'apertura.
5. Aprire con cautela la fiala disinfettata e trasferire la sospensione cellulare in una provetta da centrifuga da 15 ml contenente 8 ml di terreno di coltura a temperatura ambiente, mescolando delicatamente.
6. Centrifugare la miscela a 200 x g per 5 minuti, scartando con cura il surnatante contenente il terreno di congelamento.
7. Seguire la procedura descritta in Recupero post-scongelo

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , atmosfera umidificata.

Shipping Conditions

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

Storage Conditions

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Controllo qualità e analisi molecolare