

**Cellule P388-D1 | 400308****Informazioni generali**

<b>Description</b>	Un sottoclone di questa linea [P388 D1(IL-1)] produce alti livelli di interleuchina-1 (IL-1).
<b>Organism</b>	Mouse
<b>Tissue</b>	Ematopoietico
<b>Disease</b>	Neoplasma linfoide
<b>Synonyms</b>	P-388D1, P388D1, P388.D1, P3 88 D1

**Caratteristiche**

<b>Breed/Subspecies</b>	DBA/2
<b>Gender</b>	Donna
<b>Morphology</b>	Celle rotonde
<b>Cell type</b>	Macrofago
<b>Growth properties</b>	Sospensione

**Dati normativi**

<b>Citation</b>	P388-D1 (numero di catalogo Cytion 400308)
<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	10090
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_0477

**Dati biomolecolari**

<b>Antigen expression</b>	H-2d
---------------------------	------

**Cellule P388-D1 | 400308****Tumorigenic**      Sì, in topi nudi**Viruses**              MAP-test negativo: Sendai, Ektromelie (mousepox), Polyoma, K-Virus, Kilham, Reo 3, PVM, LCM, M.pulmonis, MVM, Theiler's GD VII, Toolan's H-1, MHV, LDV, RCV/SDA, M-Adenovirus, B.piliformis.**Reverse transcriptase**      Positivo**MSI-status**              Instabile**Manipolazione****Culture Medium**              RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO<sub>3</sub> (articolo Cytion numero 820700a)**Supplements**              Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS**Subculturing**              Mantenere le colture aggiungendo o sostituendo periodicamente il terreno di coltura. Iniziare le colture con una densità di  $2 \times 10^5$  cellule/ml e mantenere la concentrazione cellulare entro un intervallo compreso tra  $1 \times 10^5$  e  $1 \times 10^6$  cellule/ml per una crescita ottimale**Seeding density**              Subcultura a  $1 \times 10^6$  cellule vitali/ml**Fluid renewal**              Ogni 2 giorni**Post-Thaw Recovery**              Rapido. Lasciare che le cellule si riprendano dal processo di congelamento per 24 ore. Quindi contare le cellule e diluirle se sono presenti più di  $10^6$  cellule vitali.**Freeze medium**              Come terreno di crioconservazione, utilizzare un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelo, oppure CM-1 (Cytion numero di catalogo 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

## Cellule P388-D1 | 400308

### Thawing and Culturing Cells

1. Verificare che la fiala rimanga profondamente congelata al momento della consegna, poiché le cellule vengono spedite con ghiaccio secco per mantenere le temperature ottimali durante il trasporto.
2. Al ricevimento, conservare immediatamente la criovial a temperature inferiori a -150°C per garantire la conservazione dell'integrità cellulare, oppure procedere al punto 3 se è necessaria una coltura immediata.
3. Per la coltura immediata, scongelare rapidamente la fiala immergendola in un bagno d'acqua a 37°C con acqua pulita e un agente antimicrobico, agitando delicatamente per 40-60 secondi finché non rimane un piccolo grumo di ghiaccio.
4. Eseguire tutte le fasi successive in condizioni di sterilità in una cappa a flusso, disinfettando la criovial con etanolo al 70% prima dell'apertura.
5. Aprire con cautela la fiala disinfettata e trasferire la sospensione cellulare in una provetta da centrifuga da 15 ml contenente 8 ml di terreno di coltura a temperatura ambiente, mescolando delicatamente.
6. Centrifugare la miscela a 300 x g per 3 minuti per separare le cellule e scartare con cura il surnatante contenente il terreno di coltura residuo.
7. Risospendere delicatamente il pellet cellulare in 10 ml di terreno di coltura fresco. Per le cellule aderenti, dividere la sospensione tra due fiasche di coltura T25; per le colture in sospensione, trasferire tutto il terreno in una fiasca T25 per promuovere l'interazione e la crescita delle cellule.
8. Attenersi ai protocolli di subcoltura stabiliti per la crescita e il mantenimento continui della linea cellulare, garantendo risultati sperimentali affidabili.

### Incubation Atmosphere

37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , atmosfera umidificata.

### Flask Coating

Per un attaccamento e una vitalità ottimali dopo lo scongelamento, si consiglia di utilizzare **fiasche o piastre rivestite di collagene**.

### Freezing Procedure

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

## Cellule P388-D1 | 400308

### Shipping Conditions

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

### Storage Conditions

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

## Controllo di qualità / Profilo genetico / HLA

### Sterility

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.

Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.