

## Cellule HMY-1 | 305145

## Informazioni generali

## Description

La linea cellulare HMY-1 è una linea cellulare di melanoma maligno derivata da un paziente umano di sesso maschile. Il melanoma ha avuto origine sulla pianta del piede destro del paziente e successivamente ha metastatizzato ai linfonodi. Le cellule presentano una morfologia simile a quella dei fibroblasti, caratteristica delle cellule di melanoma adattate alla coltura in vitro. Inizialmente, la linea cellulare presentava una pigmentazione, un tratto comune nei melanomi, ma questa pigmentazione si è attenuata con l'affermarsi della linea cellulare e si è stabilizzata nel tempo.

Dal punto di vista genetico, la linea cellulare HMY-1 ha un numero cromosomico modale di 66, che indica significative anomalie cromosomiche tipiche delle cellule tumorali. La linea cellulare dimostra una durata di vita infinita in coltura, fornendo un modello prezioso per studi a lungo termine sulla biologia del melanoma, sulle metastasi e sugli interventi terapeutici. Come altre linee cellulari di melanoma, HMY-1 può essere utilizzata per ricerche sui meccanismi di progressione del melanoma, sulla resistenza ai farmaci e sullo sviluppo di nuovi trattamenti mirati alle cellule tumorali metastatiche.

**Organism** Umano

**Tissue** La pelle

**Disease** Melanoma

**Metastatic site** Linfonodo inguinale sinistro

**Synonyms** HMY1

## Caratteristiche

**Age** 62 anni

**Gender** Uomo

**Morphology** Fibroblasti

**Growth properties** Aderente

## Dati normativi

**Citation** HMY-1 (numero di catalogo Cytion 305145)

**Biosafety level** 1

**Cellule HMY-1 | 305145****NCBI\_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL\_2950**Dati biomolecolari****Tumorigenic** Sì**Manipolazione****Culture Medium** DMEM, w: 4,5 g/L di glucosio, w: 4 mM di L-Glutamina, w: 3,7 g/L di NaHCO<sub>3</sub>, w: 1,0 mM di piruvato di sodio (articolo Cytion numero 820300a)**Supplements** Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Doubling time** 37 ore**Subculturing** Rimuovere il vecchio terreno dalle cellule aderenti e lavarle con PBS privo di calcio e magnesio. Per le fiasche T25, utilizzare 3-5 ml di PBS e per le fiasche T75, 5-10 ml. Quindi, coprire completamente le cellule con Accutase, utilizzando 1-2 ml per le fiasche T25 e 2,5 ml per le fiasche T75. Lasciare incubare le cellule a temperatura ambiente per 8-10 minuti per staccarle. Dopo l'incubazione, mescolare delicatamente le cellule con 10 ml di terreno per risospenderle, quindi centrifugare a 300xg per 3 minuti. Scartare il surnatante, risospendere le cellule in terreno fresco e trasferirle in nuove fiasche contenenti terreno fresco.**Split ratio** da 1:2 a 1:4**Freeze medium** Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelo, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

## Cellule HMY-1 | 305145

### Thawing and Culturing Cells

1. Verificare che la fiala rimanga profondamente congelata al momento della consegna, poiché le cellule vengono spedite con ghiaccio secco per mantenere le temperature ottimali durante il trasporto.
2. Al ricevimento, conservare immediatamente la criovial a temperature inferiori a -150°C per garantire la conservazione dell'integrità cellulare, oppure procedere al punto 3 se è necessaria una coltura immediata.
3. Per la coltura immediata, scongelare rapidamente la fiala immergendola in un bagno d'acqua a 37°C con acqua pulita e un agente antimicrobico, agitando delicatamente per 40-60 secondi finché non rimane un piccolo grumo di ghiaccio.
4. Eseguire tutte le fasi successive in condizioni di sterilità in una cappa a flusso, disinfettando la criovial con etanolo al 70% prima dell'apertura.
5. Aprire con cautela la fiala disinfettata e trasferire la sospensione cellulare in una provetta da centrifuga da 15 ml contenente 8 ml di terreno di coltura a temperatura ambiente, mescolando delicatamente.
6. Centrifugare la miscela a 300 x g per 3 minuti per separare le cellule e scartare con cura il surnatante contenente il terreno di coltura residuo.
7. Risospendere delicatamente il pellet cellulare in 10 ml di terreno di coltura fresco. Per le cellule aderenti, dividere la sospensione tra due fiasche di coltura T25; per le colture in sospensione, trasferire tutto il terreno in una fiasca T25 per promuovere l'interazione e la crescita delle cellule.
8. Attenersi ai protocolli di subcoltura stabiliti per la crescita e il mantenimento continui della linea cellulare, garantendo risultati sperimentali affidabili.

### Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO<sub>2</sub>, atmosfera umidificata.

### Flask Coating

Nessuno

### Freezing Procedure

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

### Shipping Conditions

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

## Cellule HMY-1 | 305145

### Storage Conditions

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

## Controllo di qualità / Profilo genetico / HLA

### Sterility

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.

Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

### Profilo STR

**Amelogenin:** x,y  
**CSF1PO:** 12  
**D13S317:** 11,13  
**D16S539:** 10  
**D5S818:** 12  
**D7S820:** 11,14  
**TH01:** 6  
**TPOX:** 11  
**vWA:** 17,19  
**D3S1358:** 15  
**D21S11:** 30,32.2  
**D18S51:** 14,17  
**Penta E:** 17,20  
**Penta D:** 14  
**D8S1179:** 14  
**FGA:** 22  
**D6S1043:** 11,13  
**D2S1338:** 19  
**D12S391:** 22,24  
**D19S433:** 14,15.2