

## Cellule P3X63Ag8 | 305171

## Informazioni generali

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b> | Questa cellula deriva dalla linea cellulare P3K27 (una linea di coltura tissutale del plasmocitoma MOPC-21 in topi BALB/c). Le cellule sono resistenti alla 8-azaguanina (20 microgrammi/mL) ma sensibili all'HAT. A causa di una carenza nell'attività della 3-chetosteroida riduttasi, le cellule sono state segnalate come auxotrofiche del colesterolo. Questa linea cellulare è stata testata per non essere infettata dal virus dell'ectromelia (vaiolo dei topi). |
| <b>Organism</b>    | Mouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tissue</b>      | Linfociti B, flogociti, mieloma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Synonyms</b>    | P3x63Ag8, P3-x63-Ag8, P3/x63-Ag8, P3/x63 Ag8, P3/x63/Ag8, P3-x63Ag8, P3x63 Ag8, P3 x 63Ag8, P3 x 63 Ag8, x63-Ag8, x63-AG8, x63-Ag8, P3x63, x63, GM03571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Caratteristiche

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Breed/Subspecies</b>  | BALB/c      |
| <b>Gender</b>            | Donna       |
| <b>Morphology</b>        | Linfoblasto |
| <b>Growth properties</b> | Sospensione |

## Dati normativi

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Citation</b>             | P3x63Ag8 (codice catalogo Cytion 305171) |
| <b>Biosafety level</b>      | 1                                        |
| <b>NCBI_TaxID</b>           | 10090                                    |
| <b>CellosaurusAccession</b> | CVCL_3411                                |

## Dati biomolecolari

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Protein expression</b> | Immunoglobuline, anticorpi monoclonali |
|---------------------------|----------------------------------------|

## Cellule P3X63Ag8 | 305171

**Antigen expression** H-2d

## Manipolazione

**Culture Medium** RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO<sub>3</sub> (articolo Cytion numero 820700a)

**Supplements** Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

**Dissociation Reagent** Accutase

**Doubling time** da 16 a 26 ore

**Subculturing** Omogeneizzare delicatamente la sospensione cellulare nel pallone pipettando verso l'alto e verso il basso, quindi prelevare un campione rappresentativo per determinare la densità cellulare per ml. Diluire la sospensione per ottenere una concentrazione cellulare di  $1 \times 10^5$  cellule/ml con terreno di coltura fresco e aliquotare la sospensione regolata in nuovi palloni per l'ulteriore coltivazione.

**Split ratio**  $2 \times 10^5$  cellule/mL

**Seeding density** da  $3 \times 10^4$  a  $5 \times 10^4$  cellule/m<sup>2</sup>

**Fluid renewal** da 2 a 3 volte alla settimana

**Freeze medium** Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelo, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

## Cellule P3X63Ag8 | 305171

### Thawing and Culturing Cells

1. Verificare che la fiala rimanga profondamente congelata al momento della consegna, poiché le cellule vengono spedite con ghiaccio secco per mantenere le temperature ottimali durante il trasporto.
2. Al ricevimento, conservare immediatamente la criovial a temperature inferiori a -150°C per garantire la conservazione dell'integrità cellulare, oppure procedere al punto 3 se è necessaria una coltura immediata.
3. Per la coltura immediata, scongelare rapidamente la fiala immergendola in un bagno d'acqua a 37°C con acqua pulita e un agente antimicrobico, agitando delicatamente per 40-60 secondi finché non rimane un piccolo grumo di ghiaccio.
4. Eseguire tutte le fasi successive in condizioni di sterilità in una cappa a flusso, disinfettando la criovial con etanolo al 70% prima dell'apertura.
5. Aprire con cautela la fiala disinfettata e trasferire la sospensione cellulare in una provetta da centrifuga da 15 ml contenente 8 ml di terreno di coltura a temperatura ambiente, mescolando delicatamente.
6. Centrifugare la miscela a 300 x g per 3 minuti per separare le cellule e scartare con cura il surnatante contenente il terreno di coltura residuo.
7. Risospendere delicatamente il pellet cellulare in 10 ml di terreno di coltura fresco. Per le cellule aderenti, dividere la sospensione tra due fiasche di coltura T25; per le colture in sospensione, trasferire tutto il terreno in una fiasca T25 per promuovere l'interazione e la crescita delle cellule.
8. Attenersi ai protocolli di subcoltura stabiliti per la crescita e il mantenimento continui della linea cellulare, garantendo risultati sperimentali affidabili.

### Incubation Atmosphere

37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , atmosfera umidificata.

### Flask Coating

Nessuno

### Shipping Conditions

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

### Storage Conditions

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

**Cellule P3X63Ag8 | 305171**

**Controllo qualità e analisi molecolare**

**Sterility**

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.

Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.