

Cellule CCRF-CEM-C7 | 300398**Informazioni generali****Description**

La linea cellulare CCRF-CEM-C7 è un clone derivato dalla linea cellulare madre CCRF-CEM, che a sua volta proviene da una leucemia linfoblastica acuta (ALL) umana di tipo T. Questa linea cellulare è stata creata a partire da sangue periferico prelevato da una paziente femmina di 4 anni affetta da ALL. La linea cellulare CCRF-CEM-C7 è ampiamente utilizzata nella ricerca biomedica, in particolare negli studi sulla biologia del cancro, sullo screening dei farmaci e sui meccanismi di resistenza alla chemioterapia.

Le cellule CCRF-CEM-C7 sono caratterizzate da una crescita robusta in vitro e sono comunemente utilizzate per valutare la citotossicità dei composti antitumorali. Queste cellule esprimono diversi marcatori chiave dello sviluppo delle cellule T e sono spesso utilizzate per studiare la patogenesi della leucemia a cellule T, le vie di segnalazione delle cellule T e le risposte cellulari ai danni al DNA. La linea è stata anche importante negli studi che hanno indagato il ruolo dell'apoptosi nelle cellule tumorali, rendendola una risorsa preziosa per comprendere i meccanismi della morte cellulare programmata in risposta agli agenti terapeutici.

Data la sua origine e le sue caratteristiche, il CCRF-CEM-C7 funge da sistema modello per la leucemia linfoblastica acuta a cellule T, fornendo approfondimenti sul comportamento biologico di questa neoplasia e offrendo una piattaforma per testare strategie terapeutiche mirate a percorsi cellulari specifici delle neoplasie a cellule T.

Organism Umano**Tissue** Sangue**Disease** Leucemia linfoblastica acuta T dell'infanzia**Synonyms** CCRF-CEM C7, CCRF/CEM-C7, CEM-C7, CEM C7, CEMC7, CEM clone 7**Caratteristiche****Age** 3 anni e 11 mesi**Gender** Donna**Ethnicity** Caucasico**Growth properties** Sospensione**Dati normativi****Citation** CCRF-CEM-C7 (catalogo Cytion numero 300398)

Cellule CCRF-CEM-C7 | 300398

NCBI_TaxID	9606
------------	------

CellosaurusAccession	CVCL_6825
----------------------	-----------

Dati biomolecolari

Manipolazione

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO ₃ (articolo Cytion numero 820700a)
-----------------------	---

Supplements	Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS
--------------------	---

Dissociation Reagent	Accutase
-----------------------------	----------

Subculturing	Rimuovere il vecchio terreno dalle cellule aderenti e lavarle con PBS privo di calcio e magnesio. Per le fiasche T25, utilizzare 3-5 ml di PBS e per le fiasche T75, 5-10 ml. Quindi, coprire completamente le cellule con Accutase, utilizzando 1-2 ml per le fiasche T25 e 2,5 ml per le fiasche T75. Lasciare incubare le cellule a temperatura ambiente per 8-10 minuti per staccarle. Dopo l'incubazione, mescolare delicatamente le cellule con 10 ml di terreno per risospenderle, quindi centrifugare a 300xg per 3 minuti. Scartare il surnatante, risospendere le cellule in terreno fresco e trasferirle in nuove fiasche contenenti terreno fresco.
---------------------	---

Freeze medium	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelo, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.
----------------------	--

Cellule CCRF-CEM-C7 | 300398

Thawing and Culturing Cells

1. Verificare che la fiala rimanga profondamente congelata al momento della consegna, poiché le cellule vengono spedite con ghiaccio secco per mantenere le temperature ottimali durante il trasporto.
2. Al ricevimento, conservare immediatamente la criovial a temperature inferiori a -150°C per garantire la conservazione dell'integrità cellulare, oppure procedere al punto 3 se è necessaria una coltura immediata.
3. Per la coltura immediata, scongelare rapidamente la fiala immergendola in un bagno d'acqua a 37°C con acqua pulita e un agente antimicrobico, agitando delicatamente per 40-60 secondi finché non rimane un piccolo grumo di ghiaccio.
4. Eseguire tutte le fasi successive in condizioni di sterilità in una cappa a flusso, disinfettando la criovial con etanolo al 70% prima dell'apertura.
5. Aprire con cautela la fiala disinfettata e trasferire la sospensione cellulare in una provetta da centrifuga da 15 ml contenente 8 ml di terreno di coltura a temperatura ambiente, mescolando delicatamente.
6. Centrifugare la miscela a 300 x g per 3 minuti per separare le cellule e scartare con cura il surnatante contenente il terreno di coltura residuo.
7. Risospendere delicatamente il pellet cellulare in 10 ml di terreno di coltura fresco. Per le cellule aderenti, dividere la sospensione tra due fiasche di coltura T25; per le colture in sospensione, trasferire tutto il terreno in una fiasca T25 per promuovere l'interazione e la crescita delle cellule.
8. Attenersi ai protocolli di subcoltura stabiliti per la crescita e il mantenimento continui della linea cellulare, garantendo risultati sperimentali affidabili.

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO₂, atmosfera umidificata.

Flask Coating

Nessuno

Freezing Procedure

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

Shipping Conditions

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

Cellule CCRF-CEM-C7 | 300398

Storage Conditions

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Controllo di qualità / Profilo genetico / HLA

Sterility

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.

Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Profilo STR

PEZ6: WT-CLS1