Product sheet

CHO-TACD2 | 305415

Description	: . . **6,250** . CHO-TACD2 TACD2 12,600 CHO( ) . (lar TACD2 , , , - (ADC) . TACD2(TROP2) .
Organism	
Tissue	
Disease	, ; TACD2/TROP2 (GA733-1) ~
Applications	; ADC ; TROP2 ; · · ;
Age	
Gender	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	/
Citation	CHO-TACD2(305415)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10029
CellosaurusAccession	CVCL_A8X3

Product sheet

CHO-TACD2 | 305415

GMO Status	GMO-S1: CHO TACD2 . .
Receptors expressed	TACD2(TROP2 GA733-1)
Culture Medium	: DMEM: F12(1:1), w: 3.1g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2g/L NaHCO3(Cytion CHO A(InSCREENeX, InSCREENeX INS-ME-1039)
Supplements	: 5% FBS . (G418-) 0.5mg/mL .
Dissociation Reagent	: -EDTA
Doubling time	14~16
Subculturing	: PBS . PBS CO_2 /EDTA (: T25 2~3
Split ratio	1~5
Seeding density	2~5 × 10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	T25 1:2 ~ 1:3 24 ( ) .
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .