Product sheet

C6-Luc | 305620

Description	C6-Luc C6 , Benda (1968) Wistar N- . C6 C6-Luc , , (BLI)
Organism	
Tissue	
Disease	
Applications	; ; - ; .
Synonyms	C6

Age	
Gender	
Morphology	/
Growth properties	

Citation	C6-Luc (Cytion 305620)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10116
CellosaurusAccession	CVCL_E3GZ
GMO Status	GMO-S1: , (Luc2,) .

C6-Luc | 305620

Antigen expression	Luc2 (,)
Tumorigenic	; Wistar/Sprague-Dawley
Products	(luc2, pGL4.50)

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.1mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10%
Dissociation Reagent	
Doubling time	24~48
Subculturing	0.25% /EDTA , (70–80%) 1:3 1:6 .
Seeding density	1-3×10^4/cm^2
Freeze medium	+ 10% DMSO .

Thawing and Culturing Cells

1. .
2. -150°C , 3 .
3. 37°C 40~60 .
4. , 70% .
5. 8ml 15ml .
6. 200 x g 5 .
7.

Incubation Atmosphere 37°C, 5% $_{CO2}$, .

Shipping Conditions -78°C . .

Storage Conditions -150°C -196°C . 80°C .