

BS-C-1 ląstelės | 305009

Bendra informacija

Description

BS-C-1 ląstelių linija, dar vadinama Cercopithecus aethiops inkstų ląstelėmis, yra kilusi iš Afrikos žaliųjų beždžionių inkstų. Ši 1960 m. sukurta ląstelių linija plačiai naudojama virusologiniuose tyrimuose dėl jos jautrumo adenovirusams, beždžionių virusams ir kitiems patogeniniams veiksniams. BS-C-1 ląstelės pasižymi epitelio morfologija ir yra adherentiškos kultūroje, todėl jos tinka įvairiems eksperimentams, įskaitant viruso ir šeimininko sąveikos tyrimus ir citotoksiškumo tyrimus.

Vienas iš išskirtinių BS-C-1 ląstelių bruožų yra jų naudingumas dauginant ir palaikant poliovirusus, o tai palengvina vakcinų kūrimą ir virusų gyvavimo ciklo tyrimus. Šios ląstelės taip pat žinomos dėl savo vaidmens atrandant ir tiriant adenovirusus, nes labai prisidėjo prie mūsų supratimo apie virusų genetiką ir replikacijos procesus. Nepaisant jų kilmės ir pirminės paskirties, BS-C-1 ląstelės taip pat naudojamos farmakologiniuose tyrimuose ir toksikologijoje, tiriant įvairių medžiagų poveikį ląstelių procesams ir gyvybingumui.

BS-C-1 ląstelės yra vertingos molekulinėje biologijoje genų raiškos tyrimams, nes jos pasižymi tvirtomis augimo savybėmis ir gali būti palyginti lengvai transfekuojamos. Jų suderinamumas su įvairiais DNR transfekcijos metodais padeda jas naudoti genų terapijos tyrimams ir rekombinantinių baltymų gamybai. Apskritai, BS-C-1 ląstelės ir toliau yra labai svarbus biomedicininis tyrimų šaltinis, leidžiantis suprasti ląstelių elgseną ir molekulinis ligų pagrindus.

Organism Chlorocebus pygerythrus (beždžionė vervetė)

Tissue Inkstai

Synonyms BSC-1, BSC1, GMK, Biologiniai standartai-Cercopithecus-1

Charakteristikos

Morphology Epitelis

Growth properties Priglundęs

Reguliavimo duomenys

Citation BS-C-1 (Cytion katalogo numeris 305009)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9534

CellosaurusAccession CVCL_0607

BS-C-1 ląstelės | 305009

Biomolekuliniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------|
| Protein expression | Keratinas |
|---------------------------|-----------|

Tvarkymas

| | |
|-----------------------|--|
| Culture Medium | EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutaminas, w: 2,2 g/L NaHCO ₃ , w: EBSS (Cytion gaminio numeris 820100a) |
|-----------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Supplements | Papildykite terpę 10 % FBS ir 1 % NEAA |
|--------------------|--|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dissociation Reagent | Accutase |
|-----------------------------|----------|

| | |
|----------------------|-------------|
| Doubling time | 72 valandos |
|----------------------|-------------|

| | |
|---------------------|---|
| Subculturing | Pašalinkite seną terpę nuo prilipusių ląstelių ir nuplaukite jas PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio. T25 kolboms naudokite 3-5 ml PBS, o T75 kolboms - 5-10 ml. Tuomet visiškai užpilkite ląsteles "Accutase", naudodami 1-2 ml T25 kolboms ir 2,5 ml T75 kolboms. Leiskite ląstelėms inkubuotis kambario temperatūroje 8-10 minučių, kad jos atsiskirtų. Po inkubacijos atsargiai sumaišykite ląsteles su 10 ml terpės, kad jos vėl suspenduotų, tada 3 minutes centrifuguokite 300xg greičiu. Išmeskite supernatantą, vėl sutirpinkite ląsteles šviežioje terpėje ir perkelkite jas į naujas kolbas, kuriose jau yra šviežia terpė. |
|---------------------|---|

| | |
|----------------------|------------------------|
| Fluid renewal | 2-3 kartus per savaitę |
|----------------------|------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Freeze medium | Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas. |
|----------------------|---|

BS-C-1 ląstelės | 305009

Thawing and Culturing Cells

1. Patikrinkite, ar pristatant buteliuką jis išlieka gerai užšaldytas, nes ląstelės gabenamos ant sauso ledo, kad gabenimo metu būtų palaikoma optimali temperatūra.
2. Gavę iš karto laikykite kriovialą žemesnėje nei -150°C temperatūroje, kad užtikrintumėte ląstelių vientisumo išsaugojimą, arba pereikite prie 3 veiksmo, jei reikia nedelsiant kultivuoti.
3. Jei norite nedelsiant pradėti kultivuoti, greitai atšildykite buteliuką panardindami jį į 37°C temperatūros vandens vonelę su švariu vandeniu ir antimikrobine priemone, švelniai maišydami 40-60 sekundžių, kol liks nedidelis ledo gabalėlis.
4. Visus tolesnius veiksmus atlikite steriliomis sąlygomis srauto gaubte, prieš atidarydami kriovialą dezinfekuokite jį 70 % etanoliu.
5. Atsargiai atidarykite dezinfekuotą buteliuką ir perpilkite ląstelių suspensiją į 15 ml centrifugos mėgintuvėlį, kuriame yra 8 ml kambario temperatūros mitybinės terpės, atsargiai išmaišykite.
6. Mišinį centrifuguokite 300 x g greičiu 3 minutes, kad atsiskirtų ląstelės, ir atsargiai išmeskite supernatantą su šaldymo terpės likučiais.
7. Švelniai resuspenduokite ląstelių granules 10 ml šviežios mitybinės terpės. Jei ląstelės yra prigludusios, suspensiją padalykite į dvi T25 kolbas; jei tai suspensinės kultūros, visą terpę perkelti į vieną T25 kolbą, kad paskatintumėte veiksmingą ląstelių sąveiką ir augimą.
8. Laikykitės nustatytų subkultūrų protokolų, kad ląstelių linija nuolat augtų ir būtų palaikoma, taip užtikrinant patikimus eksperimentų rezultatus.

Incubation Atmosphere

37°C , 5 % CO_2 , drėkintoje atmosferoje.

Flask Coating

Nėra

Freezing Procedure

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78°C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelti mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

Shipping Conditions

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78°C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelti mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

BS-C-1 ląstelės | 305009

**Storage
Conditions**

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystą azotą.

Kokybės kontrolė / Genetinis profilis / HLA

Sterility

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.