

NCI-H929 šūnas | 305236

Vispārīga informācija

Description

NCI-H929 šūnu līnija ir cilvēka mielomas šūnu līnija, kas iegūta no pacienta kaulu smadzenēm, kuram ir multiplā mieloma - vēža veids, kas veidojas plazmas šūnās. Šīs šūnas ir īpaši noderīgas vēža pētniecībā, jo tās spēj ražot lielu daudzumu imūnglobulīna, padarot tās par lielisku modeli, lai pētītu daudzkārtējas mielomas bioloģiju un imūnglobulīna ražošanas mehānismus. NCI-H929 šūnas aug suspensijas kultūrā, un to dubultošanās laiks ir aptuveni 40 stundas, tāpēc tās ir salīdzinoši viegli pavairot laboratorijas apstākļos.

No ģenētiskā viedokļa NCI-H929 šūnām ir vairākas hromosomu anomālijas, kas parasti ir saistītas ar multiplo mielomu, tostarp translokācijas un amplifikācijas. Šīs ģenētiskās īpašības padara tās par nenovērtējamu resursu mielomas ģenētisko pamatu izpētei un potenciālo terapeitisko iejaukšanos testēšanai. Pētnieki bieži izmanto NCI-H929 šūnas zāļu skrīninga testos, lai novērtētu jaunu pret mielomas slimību vērstu savienojumu efektivitāti un izprastu zāļu rezistences mehānismus. To konsekvētā un reproducējamā uzvedība dažādos eksperimentālos apstākļos vēl vairāk palielina to lietderību pirmsklīniskajos pētījumos.

Organism

Cilvēks

Tissue

Kaulu smadzenes

Disease

Multiplā mieloma

Metastatic site

Pleiras izsvīdums

Synonyms

NCI H929, NCIH929, H929, H-929

Raksturojums

Age

62 gadi

Gender

Sievietes

Ethnicity

Eiropas

Morphology

Limfoblasts

Cell type

B limfocīts

Growth properties

Apturēšana

Normatīvie dati

NCI-H929 šūnas | 305236

Citation NCI-H929 (Cytion kataloga numurs 305236)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_1600

Biomolekulārie dati

Darbs ar

Culture Medium RPMI 1640, w: 2,0 mM stabils glutamīns, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (Cytion izstrādājuma numurs 820700a)

Supplements Papildināt barotni ar 10% FBS

Subculturing Suspensijas šūnas: Atdaliet šūnas no substrāta, pipetējot ar svaigu barotni. Lai iegūtu atsevišķas šūnas, suspensiju vairākas reizes izlaiž caur 22 collu adatu un iepilda jaunās kolbās.

Freeze medium Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

NCI-H929 šūnas | 305236

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Pārliecinieties, ka pēc piegādes flakons paliek dziļi sasaldēts, jo šūnas tiek sūtītas uz sausā ledus, lai pārvadāšanas laikā saglabātu optimālu temperatūru.
2. Pēc saņemšanas vai nu nekavējoties uzglabāt kriovialu temperatūrā, kas zemāka par -150 °C, lai nodrošinātu šūnu integritātes saglabāšanu, vai arī turpināt 3. posmu, ja nepieciešama tūlītēja kultivēšana.
3. Tūlītējas kultivēšanas gadījumā ātri atkausējiet flakonu, iegremdējot to 37°C ūdens vannā ar tīru ūdeni un antibakteriālu līdzekli, viegli maisot 40-60 sekundes, līdz paliek neliels ledus gabaliņš.
4. Visas turpmākās darbības veiciet sterilos apstākļos plūsmas nosūcējā, pirms atvēršanas dezinficējot kriovialu ar 70% etanolu.
5. Uzmanīgi atveriet dezinficēto flakonu un pārnesiet šūnu suspensiju 15 ml centrifūgas mēģenē, kurā ir 8 ml istabas temperatūras barotnes, uzmanīgi samaisot.
6. Centrifugējiet maisījumu ar 300 x g 3 minūtes, lai atdalītu šūnas, un uzmanīgi izmetiet virskārtu, kas satur saldēšanas barotnes atlikumus.
7. Viegli resuspendēt šūnu granulas 10 ml svaigas barotnes. Adhēzijas šūnu gadījumā suspensiju sadalīt divās T25 kolbās; suspensijas kultūrām visu barotni pārnest vienā T25 kolbā, lai veicinātu efektīvu šūnu mijiedarbību un augšanu.
8. Ievērojiet noteiktos subkultūru protokolus, lai nodrošinātu nepārtrauktu šūnu līnijas augšanu un uzturēšanu, tādējādi nodrošinot uzticamus eksperimentu rezultātus.

**Incubation
Atmosphere**37°C, 5% CO_2 , mitrināta atmosfēra.**Flask Coating**

Neviens

**Freezing
Procedure**

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidrums daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

NCI-H929 šūnas | 305236

**Shipping
Conditions**

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidrums daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

**Storage
Conditions**

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpekļī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Kvalitātes kontrole / Ģenētiskais profils / HLA

Sterility

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.

Lai pārlicinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.